

Cerisa.

Varhainen, pieni mukuloinen punakuorinen ruokaperuna ja salaattiperunan erikoisuus, jolla on erinomainen maku.



Vähittäiskauppa
Salaatti

- ▶ **Erittäin korkea mukulaluku**
- ▶ **Erinomaiset maku- ja ruoanlaitto-ominaisuudet**
- ▶ **Hyvä virusten vastustuskyky**



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Desmazières
Jalostaja: FRANCINE x LAURA
Jalostajan oikeudet: 31-12-2041
Taimi: DM 99-063-07

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: varhaisperuna/kesäperuna / 7,5
Vaalea verson väri: punainen violetti / RV
Kukkien väri: vaalean violetti / LP
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7
Lehdet - lopullinen kehitys: keskiverto / 7
Lehtipinta: melko hauras / 5,5
Väri: punainen / R
Lihan väri: keltainen / 7
Kuorilaatu: erinomainen / 8
Mukulan muoto: pitkä / L
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Tuberisointi: korkea / 9
Mukulan koko: keskiverto / 6
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6
Lepotila: keskiarvo / 6

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman herkkä / 7
Kasvuhalkeamat: herkkä / 5
Sadonkorjuuvauriot: hieman herkkä / 7
Metribuzin: herkkä / 5
Metribuzin: herkkä / 5
Bentazon: hieman herkkä / 7
Etyleeni: - / -
Vedenalainen paino: 391
Kuiva-ainepitoisuus: 21,3%
Keittolaatu: kiinteä / A
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): hieman herkkä / 7
Raakatummuminen: herkkä / 5,5
Ranskalaisten laatu: sopimaton / 5
Kuiva-aineen jakautuminen: erinomainen / 8
Prosessi laatu: sopimaton / 4,5
TGA-taso: 5,5

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi - 10 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

30/50 mm: 20 cm (67.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Älä käytä metributsiinia (Sencor), koska se aiheuttaa vakavia lehtivaurioita ja vähentää satoa huomattavasti.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 4 °C. Soveltuu keskipitkän ja pitkän aikavälin säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: hieman tai ei herkkä / 8

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 7

Ruoste: altis / 5

Perunarutto - varsisto: hyvin altis / 4

Perunarutto - mukula: hieman altis / 7

Fusarium: hieman altis / 6

Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: hieman altis / 6

Musta piste: hieman altis / 7

Syylätauti F1: - / -

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -