CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Cerisa.

Varhainen, pieni mukuloinen punakuorinen ruokaperuna ja salaattiperunan erikoisuus, jolla on erinomainen maku.

- **Erittäin korkea mukulaluku**
- **Erinomaiset maku- ja ruoanlaitto-ominaisuudet**
- **Hyvä virusten vastustuskyky**

Vähittäiskauppa
Salaatti



Ominaisuudet

Yleiset ominasuudet

Jalostaja: Desmazières
Jalostaja: FRANCINE x LAURA
Jalostajan oikeudet: 31-12-2041
Taimi: DM 99-063-07

Kasvin ja mukulan ominiasuudet

Kypsyys: varhaisperuna/kesäperuna / 7,5
Vaalea verson väri: punainen violetti / RV
Kukkien väri: vaalean violetti / LP
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7
Lehdet - lopullinen kehitys: keskiverto / 7
Lehtipinta: melko hauras / 5,5
Väri: punainen / R
Lihan väri: keltainen / 7
Kuorilaatu: erinomainen / 8
Mukulan muoto: pitkä / L
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Tuberisointi: korkea / 9
Mukulan koko: keskiverto / 6
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6
Lepotila: keskiarvo / 6

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman herkkä / 7
Kasvuhalkeamat: herkkä / 5
Sadonkorjuuvauriot: hieman herkkä / 7
Metribuzin: herkkä / 5
Metribuzin: herkkä / 5
Bentazon: hieman herkkä / 7
Etyleeni: - / -
Vedenalainen paino: 391
Kuiva-ainepitoisuus: 21,3%
Keittolaatu: kiinteä / A
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): hieman herkkä / 7
Raakatummuminen: herkkä / 5,5
Ranskalaisten laatu: sopimaton / 5
Kuiva-aineen jakautuminen: erinomainen / 8
Prosessi laatu: sopimaton / 4,5
TGA-taso: 5,5

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Viljelyohjeet

www.agricopotatoes.fi

Lannoitus [1]

Typpi: normi - 10 %.
Fosfori: normi.
Kalium: normi.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen.Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Istutusetäisyys

30/50 mm: 20 cm (67.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Älä käytä metributsiinia (Sencor), koska se aiheuttaa vakavia lehtivaurioita ja vähentää satoa huomattavasti.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suositeltava säilytyslämpötila on 4 ºC. Soveltuu keskipitkän ja pitkän aikavälin säilytykseen.



Say potato, say Agrico.

Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -
Virus - Yn: hieman tai ei herkkä / 8
Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 7
Ruoste: altis / 5
Perunarutto - varsisto: hyvin altis / 4
Perunarutto - mukula: hieman altis / 7
Fusarium: hieman altis / 6
Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Kuorirokko: hieman altis / 6
Musta piste: hieman altis / 7
Syylätauti F1: - / -
Syylätauti F6: - / -
Syylätauti F18: - / -
Keltainen ankeroinen Ro 1/4: - / -
Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -
Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -
Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com