

Chateau.

Varhainen salaattilajike, jolla on hyvä mukulaluku ja melko hyvä kuiva-ainepitoisuus.



Vähittäiskauppa
Erikoisuudet
Salaatti

- ▶ **Erinomainen kuori laatu**
- ▶ **Virallinen rekisteröinti chair ferme**
- ▶ **Korkea mukulaluku**



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.
Jalostaja: MA 98-0322 x AR 98-0341
Jalostajan oikeudet: 31-12-2046
Taimi: AR 05-1443

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: varhaisperuna/kesäperuna / 7,5
Vaalea verson väri: sininen violetti / BV
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: keskimääräistä korkeampi / 5,5
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7,5
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: melko kiinteä / 7
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
Kuorilaatu: hyvä / 7
Mukulan muoto: pitkä soikea / LO
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Tuberisointi: korkea / 8
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Lepotila: keskiarvo / 6

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman tai ei herkkä / 8
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5
Sadonkorjuuvauriot: herkkä / 5
Metribuzin: hieman herkkä / 7
Metribuzin: herkkä / 5
Bentazon: hieman herkkä / 7,5
Etyleni: 5-15 % enemmän mukuloita / 6
Vedenalainen paino: 350
Kuiva-ainepitoisuus: 19,2%
Keittolaatu: melko kiinteä / AB
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): hieman herkkä / 7,5
Raakatummuminen: hieman herkkä / 7,5
Ranskalaisten laatu: sopimaton / 4
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: sopimaton / 4
TGA-taso: 4,2

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 20 %.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

30/40 mm: 23 cm (58.000 kasvia/ha)

40/50 mm: 26 cm (51.500 kasvia/ha)

Rikkaruohot

Taimentulon jälkeen metribusiinin (Sencor) tavanomainen käyttö voi aiheuttaa jonkin verran lehtien reaktioita ja vähentää jonkin verran satoa.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: hieman altis / 7

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 6,5

Ruoste: altis / 5

Perunarutto - varsisto: hyvin altis / 4

Perunarutto - mukula: altis / 5,5

Fusarium: hieman altis / 7

Tavanomaninen rupi: altis / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: hyvin altis / 2

Musta piste: hyvin altis / 4,5

Syylätauti F1: kohtalaisen altis / 8

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -