

# Chateau.

Varhainen salaattilajike, jolla on hyvä mukulaluku ja melko hyvä kuiva-ainepitoisuus.



**Vähittäiskauppa**  
Erikoisuudet  
Salaatti

- ▶ **Erinomainen kuori laatu**
- ▶ **Virallinen rekisteröinti chair ferme**
- ▶ **Korkea mukulaluku**



## characteristics

### Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.  
Jalostaja: MA 98-0322 x AR 98-0341  
Jalostajan oikeudet: 31-12-2046  
Taimi: AR 05-1443

### Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: varhaisperuna/kesäperuna / 7,5  
Vaalea verson väri: sininen violetti / BV  
Kukkien väri: valkoinen / W  
Marjojen lukumäärä: keskimääräistä korkeampi / 5,5  
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7,5  
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8  
Lehtipinta: melko kiinteä / 7  
Väri: keltainen / Y  
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5  
Kuorilaatu: hyvä / 7  
Mukulan muoto: pitkä soikea / LO  
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7  
Tuberisointi: korkea / 8  
Mukulan koko: melko suuri / 7  
Koon säännöllisyys: tavanomainen / 7  
Lepotila: keskiarvo / 6

### Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5  
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman tai ei herkkä / 8  
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5  
Sadonkorjuuvauriot: herkkä / 5  
Metribuzin: hieman herkkä / 7  
Metribuzin: herkkä / 5  
Bentazon: hieman herkkä / 7,5  
Etyleni: 5-15 % enemmän mukuloita / 6  
Vedenalainen paino: 350  
Kuiva-ainepitoisuus: 19,2%  
Keittolaatu: melko kiinteä / AB  
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): hieman herkkä / 7,5  
Raakatummuminen: hieman herkkä / 7,5  
Ranskalaisten laatu: sopimaton / 4  
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -  
Prosessi laatu: sopimaton / 4  
TGA-taso: 4,2

# How to grow



[www.agricopotatoes.fi](http://www.agricopotatoes.fi)

## Lannoitus <sup>1</sup>

Typpi: normi.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 20 %.

## Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

## Planting distance

30/40 mm: 23 cm (58.000 kasvia/ha)

40/50 mm: 26 cm (51.500 kasvia/ha)

## Rikkaruohot

Taimentulon jälkeen metribusiinin (Sencor) tavanomainen käyttö voi aiheuttaa jonkin verran lehtien reaktioita ja vähentää jonkin verran satoa.

## Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

## Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

## Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



## Kestävyys

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: hieman altis / 7

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 6,5

Ruoste: altis / 5

Perunarutto - varsisto: hyvin altis / 4

Perunarutto - mukula: altis / 5,5

Fusarium: hieman altis / 7

Tavanomaninen rupi: altis / 5,5

Say potato,  
say Agrico.

Kuorirokko: hyvin altis / 2

Musta piste: hyvin altis / 4,5

Syylätauti F1: kohtalaisen altis / 8

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -