

# Twister.

Aikainen pääsato, tavanomaiseen ja luonnonmukaiseen viljelyyn tarkoitettu lajike, jolla on hyvä sato ja joka on vastustuskykyinen perunaruttoa vastaan lehdissä ja mukuloissa.

- ▶ **Kaunis ulkonäkö**
- ▶ **Hyvä varastoitavuus**
- ▶ **Melko luja ruoanlaitto**



Luomu



Vähittäiskauppa  
Tuoreet  
Pakkaus



Kuori



## characteristics

### Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: G.W. te Winkel

Jalostaja: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Jalostajan oikeudet: 31-12-2048

Taimi: TW 08-1507

### Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: kesäperuna / 7

Vaalea verson väri: punainen violetti / RV

Kukkien väri: vaalean violetti / LP

Marjojen lukumäärä: keskimääräistä korkeampi / 5,5

Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7

Lehdet - lopullinen kehitys: melko hyvä / 7,5

Lehtipinta: melko kiinteä / 7

Väri: keltainen / Y

Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5

Kuorilaatu: hyvä / 7

Mukulan muoto: pyöreä soikea / RO

Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7

Tuberisointi: keskiarvo / 6

Mukulan koko: melko suuri / 7

Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5

Lepotila: melko pitkä / 7

### Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5

Musta piste (sisäinen mustelma): hieman tai ei herkkä / 8

Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5

Sadonkorjuuvauriot: hieman herkkä / 7

Metribuzin: erittäin herkkä / 3

Metribuzin: erittäin herkkä / 3

Bentazon: melko herkkä / 6

Etyleeni: 5 % vähemmän mukuloita / 4

Vedenalainen paino: 345

Kuiva-ainepitoisuus: 19%

Keittolaatu: melko kiinteä / AB

Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6,5

Raakatumminen: melko herkkä / 6

Ranskalaisten laatu: sopimaton / 5

Kuiva-aineen jakautuminen: - / -

Prosessi laatu: sopimaton / 4

TGA-taso: 5,63

# How to grow



[www.agricopotatoes.fi](http://www.agricopotatoes.fi)

## Lannoitus <sup>1</sup>

**Typpi:** normi + 20 %.

**Fosfori:** normi.

**Kalium:** normi.

## Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Kertaalleen tapahtuva idunpoisto valinnainen.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 taimia/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

## Rikkaruohot

Älä käytä metributsiinia (Sencor), koska se aiheuttaa vakavia lehtivaurioita ja vähentää satoa huomattavasti.

## Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

## Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

## Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 6 °C. Soveltuu keskipitkän ja pitkän aikavälin säilytykseen.



## Kestävyudet

**Virus - Leaf roll:** - / -

**Virus - Yn:** hieman tai ei herkkä / 8

**Virus - Yntn (mukula):** hieman tai ei herkkä / 8

**Ruoste:** hieman altis / 6

**Perunarutto - varsisto:** hieman tai ei herkkä / 9

**Perunarutto - mukula:** hieman tai ei herkkä / 9

**Fusarium:** hieman altis / 6

**Tavanomaninen rupi:** hieman altis / 6

**Say potato,  
say Agrico.**

**Kuorirokko:** altis / 5

**Musta piste:** hieman altis / 7

**Syylätauti F1:** kohtalaisen altis / 8

**Syylätauti F6:** - / -

**Syylätauti F18:** - / -

**Keltainen ankeroinen Ro 1/4:** kestävä / 9

**Keltainen ankeroinen Ro 2/3:** - / -

**Valkoinen ankeroinen Pa 2:** - / -

**Valkoinen ankeroinen Pa 3:** - / -