

Sinora.

Aikainen pääsato, runsassatoinen ja helppokasvuinen lajike varhaisperunoiden tai sipsien viljelyyn.

- ▶ **Varhainen toimitus suoraan kentältä**
- ▶ **Korkea kuiva-ainepitoisuus**
- ▶ **Hyvä virusten vastustuskyky**



Teollisuus
Ranskalaiset
perunat
Sipsi



the
ORIGINAL

characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: J. Schilt

Jalostaja: AGRIA x AM 70-2166

Jalostajan oikeudet: 31-12-2027

Taimi: SI 85-0482

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: kesäperuna / 7

Vaalea verson väri: sininen violetti / BV

Kukkien väri: valkoinen / W

Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4

Lehdet - alkukehitys: nopea / 8

Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8

Lehtipinta: melko kiinteä / 7,5

Väri: keltainen / Y

Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5

Kuorilaatu: keskiverto / 6

Mukulan muoto: soikea pyöreä / OR

Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6

Tuberisointi: melko korkea / 7

Mukulan koko: melko suuri / 7

Koon säännöllisyys: tavanomainen / 7

Lepotila: keskiarvo / 6

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5

Musta piste (sisäinen mustelma): melko herkkä / 6,5

Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5

Sadonkorjuuvauriot: erittäin herkkä / 4,5

Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8

Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8

Bentazon: melko herkkä / 6,5

Etyleeni: - / -

Vedenalainen paino: 416

Kuiva-ainepitoisuus: 22,6%

Keittolaatu: melko jauhoinen / B

Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): herkkä / 5

Raakatummuminen: herkkä / 5

Ranskalaisten laatu: erittäin hyvä / 7,5

Kuiva-aineen jakautuminen: hyvä / 7

Prosessi laatu: hyvä / 7

TGA-taso: 8,2

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi + 25 %. Orgaanisen lannan käyttöä ei suositella.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 10 %.

Siementen käsittely

Asianmukainen esiidätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun. Useammin kuin kaksi kertaa tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Älä säilytä käsittelyä varten alle 7 °C. Soveltuu toimitettavaksi suoraan pellolta tai lyhytaikaiseen varastointiin.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: hieman altis / 6

Virus - Yn: hieman altis / 7

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 7

Ruoste: hieman altis / 6

Perunarutto - varsisto: hyvin altis / 4,5

Perunarutto - mukula: altis / 5

Fusarium: hieman altis / 6

Tavanomaninen rupi: altis / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: altis / 5

Musta piste: - / -

Syylätauti F1: - / -

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: altis / 4

Valkoinen ankeroinen Pa 3: altis / 2