

# Adato.

Varhainen pääviljelylajike, jolla on melko suuret mukulat ja melko korkea kuiva-ainepitoisuus.


- ▶ Hyvä kuori laatu
- ▶ Hyvä kuivuuden sietokyky
- ▶ Sopii ruoanlaittoon ja kotileivonnaisiin



Vähittäiskauppa  
Pakkaus



Kuori



## characteristics

### Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Lantmännen Seed B.V.  
Jalostaja: NICOLA x RED BARON  
Jalostajan oikeudet: 31-12-2046  
Taimi: SW 04-0087

### Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 6  
Vaalea verson väri: punainen violetti / RV  
Kukkien väri: valkoinen / W  
Marjojen lukumäärä: alle keskiarvon / 6,5  
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7,5  
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8  
Lehtipinta: kiinteä / 8  
Väri: keltainen / Y  
Lihan väri: kermanvalkoinen / 5,5  
Kuorilaatu: erittäin hyvä / 7,5  
Mukulan muoto: soikea pitkä / OL  
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5  
Tuberisointi: melko korkea / 7  
Mukulan koko: melko suuri / 7,5  
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5  
Lepotila: melko lyhyt / 5,5

### Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5  
Musta piste (sisäinen mustelma): melko herkkä / 6,5  
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5  
Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6  
Metribuzin: hieman herkkä / 7,5  
Metribuzin: hieman herkkä / 7  
Bentazon: hieman tai ei herkkä / 8  
Etyleeni: 5-15 % enemmän mukuloita / 6  
Vedenalainen paino: 374  
Kuiva-ainepitoisuus: 20,4%  
Keittolaatu: jauhoinen / BC  
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6,5  
Raakatumminen: hieman herkkä / 7  
Ranskalaisten laatu: keskimääräistä parempi / 6,5  
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -  
Prosessi laatu: keskiarvo / 6  
TGA-taso: 4,56

# How to grow



[www.agricopotatoes.fi](http://www.agricopotatoes.fi)

## Lannoitus <sup>1</sup>

**Typpi:** normi + 20 %. Mieluiten jaettuna levityksenä, toinen käsittely pian mukuloiden muodostumisen jälkeen.

**Fosfori:** normi.

**Kalium:** normi + 10 %.

## Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Kertaalleen tapahtuva idunpoisto valinnainen.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 taimia/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

## Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

## Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

## Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

## Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



## Kestävyydet

**Virus - Leaf roll:** - / -

**Virus - Yn:** hieman altis / 6,5

**Virus - Yntn (mukula):** hieman altis / 6

**Ruoste:** hieman altis / 6

**Perunarutto - varsisto:** altis / 5

**Perunarutto - mukula:** hieman altis / 7,5

**Fusarium:** hieman altis / 6,5

**Tavanomaninen rupi:** hieman altis / 6

Say potato,  
say Agrico.

**Kuorirokko:** hyvin altis / 2

**Musta piste:** altis / 5

**Syylätauti F1:** hieman altis / 9

**Syylätauti F6:** - / -

**Syylätauti F18:** - / -

**Keltainen ankeroinen Ro 1/4:** kestävä / 9

**Keltainen ankeroinen Ro 2/3:** - / -

**Valkoinen ankeroinen Pa 2:** - / -

**Valkoinen ankeroinen Pa 3:** - / -