

Allstar.

Tärkkelyslajike, jolla on hyvä tärkkelyssato ja joka on vastustuskykyinen erityyppisille perunan syyllälahotaudeille.

- ▶ **Melko suuret mukulat**
- ▶ **Korkea kuiva-ainepitoisuus**
- ▶ **Hyvä vastustuskyky**



Teollisuus
Tärkkelys



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: J.L. Spijkman
 Jalostaja: KURAS x SERESTA
 Jalostajan oikeudet: 31-12-2045
 Taimi: SA 05-0204

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: pääsato / 4,5
 Vaalea verson väri: sininen violetti / BV
 Kukkien väri: valkoinen / W
 Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
 Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7
 Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
 Lehtipinta: melko kiinteä / 7
 Väri: keltainen / Y
 Lihan väri: kermanvalkoinen / 5
 Kuorilaatu: melko huono / 5
 Mukulan muoto: pyöreä soikea / RO
 Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6
 Tuberisointi: melko korkea / 7
 Mukulan koko: melko suuri / 7
 Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6
 Lepotila: keskiarvo / 6

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6
 Musta piste (sisäinen mustelma): erittäin herkkä / 4
 Kasvuhalkeamat: hieman herkkä / 7
 Sadonkorjuuvauriot: herkkä / 5
 Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
 Metribuzin: hieman herkkä / 7,5
 Bentazon: hieman tai ei herkkä / 8
 Etyleeni: 15-25 % enemmän mukuloita / 7
 Vedenalainen paino: 508
 Kuiva-ainepitoisuus: 27%
 Keittolaatu: jauhoinen / C
 Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): erittäin herkkä / 4
 Raakatumminen: - / -
 Ranskalaisten laatu: sopimaton / 4
 Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
 Prosessi laatu: sopimaton / 5
 TGA-taso: 10,1

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi + 5 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 20 %.

Siementen käsittely

Lyhyt lämpöshokki tai asianmukainen esiidätys on suositeltavaa. Asianmukainen esiidätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun. Kertaalleen tapahtuva idunpoisto valinnainen.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 taimia/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 taimia/ha)

Allstarilla on pitkät tyvitumakkeet, joten istuta lajike ei liian syväälle.

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Suosittelaa ennaltaehkäisevää ruiskutus suunnitelmaa perunaruttoa vastaan.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: hieman tai ei herkkä / 8

Virus - Yntn (mukula): hieman tai ei herkkä / 9

Ruoste: hieman altis / 6

Perunarutto - varsisto: hieman altis / 6

Perunarutto - mukula: hieman altis / 6,5

Fusarium: - / -

Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: hieman tai ei herkkä / 8

Musta piste: - / -

Syylätauti F1: hieman altis / 9

Syylätauti F6: kestävä / 10

Syylätauti F18: hieman altis / 9

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: altis / 4

Valkoinen ankeroinen Pa 2: kohtalaisen altis / 6

Valkoinen ankeroinen Pa 3: altis / 4