CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Ardeche.

Varhainen tärkkelyslajike, jolla on hyvä sato, joka kestää perunaruttoa lehdissä ja mukuloissa ja joka soveltuu hiutaleiden tuotantoon.

- **Hyvä tärkkelyksen tuotto**
- **Moninkertainen peruna-ankeroisten kestävyys**
- **Hyvä virusten vastustuskyky**

Luomu

Teollisuus
Hiutaleet
Tärkkelys



Ominaisuudet

Yleiset ominasuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.
Jalostaja: STAYER x AR 02-2139
Jalostajan oikeudet: 31-12-2048
Taimi: AR 07-2451

Kasvin ja mukulan ominiasuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 5,5
Vaalea verson väri: vihreä punainen / GR
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: keskiarvo / 6
Lehdet - alkukehitys: nopea / 8
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: melko kiinteä / 7,5
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
Kuorilaatu: erittäin huono / 4
Mukulan muoto: pyöreä soikea / RO
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Tuberisointi: melko alhainen / 5
Mukulan koko: melko suuri / 7,5
Koon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Lepotila: melko lyhyt / 5,5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6
Musta piste (sisäinen mustelma): erittäin herkkä / 4,5
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6
Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6
Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
Bentazon: hieman tai ei herkkä / 8
Etyleeni: 15-25 % enemmän mukuloita / 7
Vedenalainen paino: 474
Kuiva-ainepitoisuus: 25,3%
Keittolaatu: jauhoinen / C
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6,5
Raakatummuminen: - / -
Ranskalaisten laatu: sopimaton / 4
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: keskiarvo / 6
TGA-taso: 4,7

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Viljelyohjeet

www.agricopotatoes.fi

Lannoitus [1]

Typpi: normi + 10 %.
Fosfori: normi.
Kalium: normi + 20 %.

Siementen käsittely

Asianmukainen esiidätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun.Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Istutusetäisyys

28/35 mm: 21 cm (64.000 taimia/ha)
35/55 mm: 26 cm (50.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suositeltava säilytyslämpötila on 8 ºC. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Say potato, say Agrico.

Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -
Virus - Yn: hieman altis / 6
Virus - Yntn (mukula): hieman tai ei herkkä / 8,5
Ruoste: hieman altis / 6
Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 9
Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 9
Fusarium: - / -
Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Kuorirokko: hieman altis / 6,5
Musta piste: hieman altis / 7
Syylätauti F1: kohtalaisen altis / 8
Syylätauti F6: kohtalaisen altis / 8
Syylätauti F18: - / -
Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9
Keltainen ankeroinen Ro 2/3: kestävä / 9
Valkoinen ankeroinen Pa 2: kestävä / 9
Valkoinen ankeroinen Pa 3: kenttäkestävä / 7

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com