

Ardeche.

Varhainen tärkkelyslajike, jolla on hyvä sato, joka kestää perunaruttoa lehdissä ja mukuloissa ja joka soveltuu hiutaleiden tuotantoon.



Luomu



Teollisuus
Hiutaleet
Tärkkelys

- ▶ Hyvä tärkkelyksen tuotto
- ▶ Moninkertainen peruna-ankeeroisten kestävyys
- ▶ Hyvä virusten vastustuskyky



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.
Jalostaja: STAYER x AR 02-2139
Jalostajan oikeudet: 31-12-2048
Taimi: AR 07-2451

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 5,5
Vaalea verson väri: vihreä punainen / GR
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: keskiarvo / 6
Lehdet - alkukehitys: nopea / 8
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: melko kiinteä / 7,5
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
Kuorilaatu: erittäin huono / 4
Mukulan muoto: pyöreä soikea / RO
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Tuberisointi: melko alhainen / 5
Mukulan koko: melko suuri / 7,5
Koon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Lepotila: melko lyhyt / 5,5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6
Musta piste (sisäinen mustelma): erittäin herkkä / 4,5
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6
Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6
Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
Bentazon: hieman tai ei herkkä / 8
Etyleeni: 15-25 % enemmän mukuloita / 7
Vedenalainen paino: 474
Kuiva-ainepitoisuus: 25,3%
Keittolaatu: jauhoinen / C
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6,5
Raakatumminen: - / -
Ranskalaisten laatu: sopimaton / 4
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: keskiarvo / 6
TGA-taso: 4,7

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi + 10 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 20 %.

Siementen käsittely

Asianmukainen esiädätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

28/35 mm: 21 cm (64.000 taimia/ha)

35/55 mm: 26 cm (50.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 8 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Kestävyudet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: hieman altis / 6

Virus - Yntn (mukula): hieman tai ei herkkä / 8,5

Ruoste: hieman altis / 6

Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 9

Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 9

Fusarium: - / -

Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: hieman altis / 6,5

Musta piste: hieman altis / 7

Syylätauti F1: kohtalaisen altis / 8

Syylätauti F6: kohtalaisen altis / 8

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: kestävä / 9

Valkoinen ankeroinen Pa 2: kestävä / 9

Valkoinen ankeroinen Pa 3: kenttäkestävä / 7