

# Arrow.

Ensimmäinen varhainen lajike, jolla on erittäin houkutteleva kuori ja jota voidaan viljellä erityyppisillä mailla.


- ▶ **Kermanvärinen liha**
- ▶ **Soikeat pitkät mukulat**
- ▶ **Hyvä kuivuuden sietokyky**



**Vähittäiskauppa**  
Tuoreet  
Pakkaus



**Kuori**



## characteristics

### Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.

Jalostaja: SOLARA x FRESCO

Jalostajan oikeudet: 31-12-2034

Taimi: AR 93-0084

### Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: varhaisperuna / 8

Vaalea verson väri: - / -

Kukkien väri: valkoinen / W

Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4

Lehdet - alkukehitys: keskiverto / 6,5

Lehdet - lopullinen kehitys: keskiverto / 7

Lehtipinta: keskiverto / 6

Väri: keltainen / Y

Lihan väri: kermanvalkoinen / 5

Kuorilaatu: erinomainen / 8

Mukulan muoto: soikea pitkä / OL

Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7

Tuberisointi: melko alhainen / 5

Mukulan koko: suuri / 8

Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5

Lepotila: melko lyhyt / 5

### Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6

Musta piste (sisäinen mustelma): hieman herkkä / 7

Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5

Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6

Metribuzin: herkkä / 5

Metribuzin: herkkä / 5

Bentazon: - / -

Etyleeni: 15-25 % enemmän mukuloita / 7

Vedenalainen paino: 355

Kuiva-ainepitoisuus: 19,5%

Keittolaatu: melko kiinteä / AB

Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): hieman herkkä / 7

Raakatummuminen: - / -

Ranskalaisten laatu: sopimaton / 4

Kuiva-aineen jakautuminen: - / -

Prosessi laatu: sopimaton / 4

TGA-taso: 2,8

# How to grow



[www.agricopotatoes.fi](http://www.agricopotatoes.fi)

## Lannoitus <sup>1</sup>

**Typpi:** normi + 10 %. Mieluiten jaettuna levityksenä, toinen käsittely pian mukuloiden muodostumisen jälkeen.

**Fosfori:** normi.

**Kalium:** normi.

## Siementen käsittely

Asianmukainen esiidätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

## Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67.000 taimia/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

## Rikkaruohot

Taimentulon, metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö aiheuttaa vakavia lehtivaurioita ja jonkin verran sadon alenemista.

## Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

## Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

## Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Soveltuu toimitettavaksi suoraan pellolta tai lyhytaikaiseen varastointiin.



## Kestävyydet

**Virus - Leaf roll:** - / -

**Virus - Yn:** altis / 5,5

**Virus - Yntn (mukula):** hieman altis / 7,5

**Ruoste:** hieman altis / 6

**Perunarutto - varsisto:** hyvin altis / 4

**Perunarutto - mukula:** hieman altis / 7

**Fusarium:** altis / 5

**Tavanomaninen rupi:** hieman altis / 6

Say potato,  
say Agrico.

**Kuorirokko:** altis / 5

**Musta piste:** hieman altis / 7,5

**Syylätauti F1:** kestävä / 10

**Syylätauti F6:** - / -

**Syylätauti F18:** - / -

**Keltainen ankeroinen Ro 1/4:** kestävä / 9

**Keltainen ankeroinen Ro 2/3:** - / -

**Valkoinen ankeroinen Pa 2:** - / -

**Valkoinen ankeroinen Pa 3:** - / -