CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Arsenal.

Varhainen pääsato, jolla on laaja peruna-ankeroisten vastustuskyky ja hyvä sato.

- **Hyvä vatustuuskyky**
- **Sopii teollisuus ja hiutaleiksi**
- **Korkea kuiva-ainepitoisuus**

Teollisuus
Sipsi
Hiutaleet



Ominaisuudet

Yleiset ominasuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.
Jalostaja: AR 92-1146 x SILVESTER
Jalostajan oikeudet: 31-12-2040
Taimi: AR 98-0851

Kasvin ja mukulan ominiasuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 5,5
Vaalea verson väri: sininen violetti / BV
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: keskiverto / 6,5
Lehdet - lopullinen kehitys: keskiverto / 7
Lehtipinta: melko kiinteä / 7
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6
Kuorilaatu: melko huono / 5
Mukulan muoto: pyöreä soikea / RO
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Tuberisointi: melko korkea / 7
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Lepotila: melko lyhyt / 5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: hieman herkkä / 7
Musta piste (sisäinen mustelma): melko herkkä / 6
Kasvuhalkeamat: herkkä / 5
Sadonkorjuuvauriot: hieman herkkä / 7
Metribuzin: hieman herkkä / 7,5
Metribuzin: hieman herkkä / 7,5
Bentazon: hieman herkkä / 7,5
Etyleeni: - / -
Vedenalainen paino: 447
Kuiva-ainepitoisuus: 24%
Keittolaatu: jauhoinen / BC
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6
Raakatummuminen: melko herkkä / 6,5
Ranskalaisten laatu: erittäin hyvä / 7,5
Kuiva-aineen jakautuminen: hyvä / 7,5
Prosessi laatu: hyvä / 7
TGA-taso: 4,1

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

CULTIVATION RECOMMENDATION

Viljelyohjeet

www.agricopotatoes.fi

Lannoitus [1]

Typpi: normi.
Fosfori: normi.
Kalium: normi + 10 %.

Siementen käsittely

Asianmukainen esiidätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun.Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Istutusetäisyys

28/35 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)
35/50 mm: 30 cm (45.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Taimentulon jälkeen metribusiinin (Sencor) tavanomainen käyttö voi aiheuttaa jonkin verran reaktioita lehdissä, mutta harvoin sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Älä säilytä käsittelyä varten alle 9 ºC. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Say potato, say Agrico.

Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -
Virus - Yn: hieman tai ei herkkä / 8
Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 6,5
Ruoste: hieman altis / 7
Perunarutto - varsisto: hyvin altis / 4,5
Perunarutto - mukula: altis / 5,5
Fusarium: altis / 5
Tavanomaninen rupi: altis / 5

Kuorirokko: hieman tai ei herkkä / 8
Musta piste: - / -
Syylätauti F1: kestävä / 10
Syylätauti F6: - / -
Syylätauti F18: - / -
Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9
Keltainen ankeroinen Ro 2/3: kenttäkestävä / 8
Valkoinen ankeroinen Pa 2: kestävä / 9
Valkoinen ankeroinen Pa 3: kenttäkestävä / 8

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com