

Arsenal.

Varhainen pääsato, jolla on laaja peruna-ankeroisten vastustuskyky ja hyvä sato.

- ▶ Hyvä vastustuskyky
- ▶ Sopii teollisuus ja hiutaleiksi
- ▶ Korkea kuiva-ainepitoisuus



Teollisuus
Sipsi
Hiutaleet



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.
Jalostaja: AR 92-1146 x SILVESTER
Jalostajan oikeudet: 31-12-2040
Taimi: AR 98-0851

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 5,5
Vaalea verson väri: sininen violetti / BV
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: keskiverto / 6,5
Lehdet - lopullinen kehitys: keskiverto / 7
Lehtipinta: melko kiinteä / 7
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6
Kuorilaatu: melko huono / 5
Mukulan muoto: pyöreä soikea / RO
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Tuberisointi: melko korkea / 7
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Lepotila: melko lyhyt / 5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: hieman herkkä / 7
Musta piste (sisäinen mustelma): melko herkkä / 6
Kasvuhalkeamat: herkkä / 5
Sadonkorjuuvauriot: hieman herkkä / 7
Metribuzin: hieman herkkä / 7,5
Metribuzin: hieman herkkä / 7,5
Bentazon: hieman herkkä / 7,5
Etyleeni: - / -
Vedenalainen paino: 447
Kuiva-ainepitoisuus: 24%
Keittolaatu: jauhoinen / BC
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6
Raakatumminen: melko herkkä / 6,5
Ranskalaisten laatu: erittäin hyvä / 7,5
Kuiva-aineen jakautuminen: hyvä / 7,5
Prosessi laatu: hyvä / 7
TGA-taso: 4,1

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 10 %.

Siementen käsittely

Asianmukainen esiidätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

35/50 mm: 30 cm (45.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Taimentulon jälkeen metribusiinin (Sencor) tavanomainen käyttö voi aiheuttaa jonkin verran reaktioita lehdistä, mutta harvoin sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Älä säilytä käsittelyä varten alle 9 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Kestävyudet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: hieman tai ei herkkä / 8

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 6,5

Ruoste: hieman altis / 7

Perunarutto - varsisto: hyvin altis / 4,5

Perunarutto - mukula: altis / 5,5

Fusarium: altis / 5

Tavanomaninen rupi: altis / 5

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: hieman tai ei herkkä / 8

Musta piste: - / -

Syylätauti F1: kestävä / 10

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: kenttäkestävä / 8

Valkoinen ankeroinen Pa 2: kestävä / 9

Valkoinen ankeroinen Pa 3: kenttäkestävä / 8