

# Beyonce.

Varhainen pääviljelykasvi, jolla on hyvä kuiva-ainepitoisuus, joka soveltuu keskipitkään varastointiin ja jonka lehdet ja mukulat ovat vastustuskykyisiä myöhäistä ruttoa vastaan.

- » **Suuret mukulat**
- » **Hyvä lepotila**
- » **Melko korkea mukuloituminen**



Luomu



Teollisuus  
Sipsi  
Hiutaleet



## characteristics

### Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.  
Jalostaja: AR 94-2061 x LADY JO  
Jalostajan oikeudet: 31-12-2049  
Taimi: AR 08-3271

### Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 6  
Vaalea version väri: sininen violetti / BV  
Kukkien väri: violetti / P  
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4  
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7,5  
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8  
Lehtipinta: melko kiinteä / 7,5  
Väri: keltainen / Y  
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5  
Kuorilaatu: alle keskiarvon / 5,5  
Mukulan muoto: soikea pyöreä / OR  
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5  
Tuberisointi: melko korkea / 7  
Mukulan koko: melko suuri / 7,5  
Koon säännöllisyys: tavanomainen / 7  
Lepotila: melko pitkä / 7

### Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6  
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman herkkä / 7,5  
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5  
Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6  
Metribuzin: melko herkkä / 6,5  
Metribuzin: hieman herkkä / 7  
Bentazon: hieman tai ei herkkä / 8  
Etyleni: 5 % vähemmän - 5 % enemmän mukuloita / 5  
Vedenalainen paino: 446  
Kuiva-ainepitoisuus: 23,9%  
Keittolaatu: jauhoinen / BC  
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): hieman herkkä / 7  
Raakatummuminen: hieman tai ei herkkä / 8  
Ranskalaisten laatu: hyvä / 7  
Kuiva-aineen jakautuminen: keskiverto / 6,5  
Prosessi laatu: erinomainen / 8  
TGA-taso: 6,5

# How to grow



[www.agricopotatoes.fi](http://www.agricopotatoes.fi)

## Lannoitus <sup>1</sup>

Typpi: normi.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 25 %.

## Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Itujen poistamisella voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

## Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 taimia/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 taimia/ha)

## Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

## Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

## Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

## Varastointilämpötila - Varastointiaika

Älä säilytä käsittelyä varten alle 9 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



## Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: altis / 5,5

Virus - Yntn (mukula): altis / 5

Ruoste: hieman altis / 6

Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 8,5

Perunarutto - mukula: hieman altis / 7,5

Fusarium: hieman altis / 7,5

Tavanomaninen rupi: altis / 5,5

Say potato,  
say Agrico.

Kuorirokko: hieman altis / 6

Musta piste: hieman altis / 7,5

Syylätauti F1: - / -

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: altis / 4

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -