CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Carolus.

Varhainen pääsato, monikäyttöinen ruokalajike, jolla on houkuttelevat punasilmäiset silmät ja myöhäisen ruven kestävyys lehdissä ja mukuloissa.

- **Monikäyttöinen lajike**
- **Korkea kuiva-ainepitoisuus**
- **Jauhoinen ruoanlaitto**

Luomu **Vähittäiskauppa** Pakkaus **Kuori**



Ominaisuudet

Yleiset ominasuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.
Jalostaja: AGRIA x AR 00-94-17
Jalostajan oikeudet: 31-12-2043
Taimi: AR 02-3225

Kasvin ja mukulan ominiasuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 6
Vaalea verson väri: sininen violetti / BV
Kukkien väri: violetti / P
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: keskiverto / 6
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: kiinteä / 8
Väri: keltainen ja punaiset silmät / Y/R
Lihan väri: keltainen / 7
Kuorilaatu: hyvä / 7
Mukulan muoto: soikea / O
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Tuberisointi: keskiarvo / 6
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Lepotila: keskiarvo / 6,5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: hieman herkkä / 7
Musta piste (sisäinen mustelma): melko herkkä / 6
Kasvuhalkeamat: herkkä / 5,5
Sadonkorjuuvauriot: herkkä / 5,5
Metribuzin: erittäin herkkä / 4,5
Metribuzin: melko herkkä / 6
Bentazon: melko herkkä / 6
Etyleeni: 15-25 % enemmän mukuloita / 7
Vedenalainen paino: 398
Kuiva-ainepitoisuus: 21,6%
Keittolaatu: jauhoinen / BC
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6
Raakatummuminen: hieman herkkä / 7
Ranskalaisten laatu: hyvä / 7
Kuiva-aineen jakautuminen: erinomainen / 8
Prosessi laatu: hyvä / 7
TGA-taso: 5,4

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Viljelyohjeet

www.agricopotatoes.fi

Lannoitus [1]

Typpi: normi + 10 %.
Fosfori: normi.
Kalium: normi + 15 %.

Siementen käsittely

Lyhyt lämpöshokki tai asianmukainen esiidätys on suositeltavaa.Istuta mukulat mieluiten lämpimään maahan, sillä lajikkeen alkukehitys on hidasta.Itujen poistamisella voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Istutusetäisyys

28/35 mm: 20 cm (66.500 taimia/ha)
35/55 mm: 27 cm (49.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Älä käytä metributsiinia (Sencor), koska se aiheuttaa vakavia lehtivaurioita ja vähentää satoa huomattavasti.

Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suositeltava säilytyslämpötila on 5 ºC. Älä säilytä käsittelyä varten alle 7 ºC. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Say potato, say Agrico.

Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -
Virus - Yn: hieman altis / 7
Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 7
Ruoste: hieman altis / 6
Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 9
Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 9
Fusarium: hieman altis / 6
Tavanomaninen rupi: altis / 5

Kuorirokko: altis / 5
Musta piste: hieman altis / 6
Syylätauti F1: kestävä / 10
Syylätauti F6: - / -
Syylätauti F18: - / -
Keltainen ankeroinen Ro 1/4: - / -
Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -
Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -
Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com