

Carolus.

Varhainen pääsato, monikäyttöinen ruokalajike, jolla on houkuttelevat punasilmäiset silmät ja myöhäisen ruven kestävyys lehdissä ja mukuloissa.

- ▮ **Monikäyttöinen lajike**
- ▮ **Korkea kuiva-ainepitoisuus**
- ▮ **Jauhoinen ruoanlaitto**



Luomu



Vähittäiskauppa
Pakkaus



Kuori



Ominaisuudet

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Agrico Research B.V.
Jalostaja: AGRIA x AR 00-94-17
Jalostajan oikeudet: 31-12-2043
Taimi: AR 02-3225

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 6
Vaalea version väri: sininen violetti / BV
Kukkien väri: violetti / P
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: keskiverto / 6
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: kiinteä / 8
Väri: keltainen ja punaiset silmät / Y/R
Lihan väri: keltainen / 7
Kuorilaatu: hyvä / 7
Mukulan muoto: soikea / O
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Tuberisointi: keskiarvo / 6
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Lepotila: keskiarvo / 6,5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: hieman herkkä / 7
Musta piste (sisäinen mustelma): melko herkkä / 6
Kasvuhalkeamat: herkkä / 5,5
Sadonkorjuuvauriot: herkkä / 5,5
Metribuzin: erittäin herkkä / 4,5
Metribuzin: melko herkkä / 6
Bentazon: melko herkkä / 6
Etyleeni: 15-25 % enemmän mukuloita / 7
Vedenalainen paino: 398
Kuiva-ainepitoisuus: 21,6%
Keittolaatu: jauhoinen / BC
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6
Raakatummuminen: hieman herkkä / 7
Ranskalaisten laatu: hyvä / 7
Kuiva-aineen jakautuminen: erinomainen / 8
Prosessi laatu: hyvä / 7
TGA-taso: 5,4

Viljelyohjeet



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi + 10 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 15 %.

Siementen käsittely

Lyhyt lämpöshokki tai asianmukainen esiidätys on suositeltavaa. Istuta mukulat mieluiten lämpimään maahan, sillä lajikkeen alkukehitys on hidasta. Itujen poistamisella voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Istutusetäisyys

28/35 mm: 20 cm (66.500 taimia/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Älä käytä metributsiinia (Sencor), koska se aiheuttaa vakavia lehtivaurioita ja vähentää satoa huomattavasti.

Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Älä säilytä käsittelyä varten alle 7 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: hieman altis / 7

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 7

Ruoste: hieman altis / 6

Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 9

Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 9

Fusarium: hieman altis / 6

Tavanomaninen rupi: altis / 5

**Say potato,
say Agrico.**

Kuorirokko: altis / 5

Musta piste: hieman altis / 6

Syylätauti F1: kestävä / 10

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -