

Ditta.

Monipuolinen varhaisperuna, joka soveltuu tavanomaiseen ja luonnonmukaiseen viljelyyn.




Luomu



Vähittäiskauppa
Pakkaus
Salaatti

- ▶ Erinomainen kuluttajalaatu
- ▶ Hyvä varastoitavuus
- ▶ Hyvä vastustuskyky



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Nieder Österreichische
Saatbaugenossenschaft
Jalostaja: BINTJE x QUARTA
Jalostajan oikeudet: Vanhentunut
Taimi: SW 80-0540

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 6
Vaalea verson väri: sininen violetti / BV
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7,5
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: melko kiinteä / 7
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
Kuurilaatu: hyvä / 7
Mukulan muoto: pitkä soikea / LO
Mukulan muodon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Tuberisointi: melko korkea / 7
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Lepotila: melko pitkä / 7

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman herkkä / 7
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5
Sadonkorjuuvauriot: herkkä / 5,5
Metribuzin: hieman herkkä / 7
Metribuzin: hieman herkkä / 7
Bentazon: melko herkkä / 6,5
Etyleeni: - / -
Vedenalainen paino: 369
Kuiva-ainepitoisuus: 20,2%
Keittolaatu: kiinteä / A
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6
Raakatumminen: erittäin herkkä / 4
Ranskalaisten laatu: alle keskiarvon / 5,5
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: sopimaton / 4
TGA-taso: -

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi - 10 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 taimia/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Taimentulon jälkeen metribusiiniin (Sencor) tavanomainen käyttö voi aiheuttaa jonkin verran reaktioita lehdissä, mutta harvoin sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: hieman altis / 7

Virus - Yn: hieman altis / 7,5

Virus - Yntn (mukula): altis / 5

Ruoste: altis / 5

Perunarutto - varsisto: altis / 5,5

Perunarutto - mukula: hieman altis / 7

Fusarium: hieman altis / 6

Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

**Say potato,
say Agrico.**

Kuorirokko: hieman altis / 6,5

Musta piste: hieman altis / 6

Syylätauti F1: kestävä / 10

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -