


Gourmandine.



Vähittäiskauppa
Salaatti
Erikoisuudet

aikainen pääsato lajike ja salaattierikoisuus, jolla on houkutteleva, sileä kuori ja miellyttävä, täyteläinen maku.

- ▶ **Kiinteä ruoanlaitto**
- ▶ **Hieno esitys**
- ▶ **Hyvä varastoitavuus**



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Bretagne Plants
Jalostaja: CHARLOTTE x ESTIMA
Jalostajan oikeudet: 31-12-2032
Taimi: 92 F 229-11

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: kesäperuna / 7
Vaalea verson väri: punainen violetti / RV
Kukkien väri: violetti / P
Marjojen lukumäärä: keskiarvo / 6
Lehdet - alkukehitys: keskiverto / 6
Lehdet - lopullinen kehitys: keskiverto / 7
Lehtipinta: melko kiinteä / 7
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
Kuorilaatu: hyvä / 7
Mukulan muoto: pitkä soikea / LO
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Tuberisointi: melko korkea / 7
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Lepotila: pitkä / 8

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman herkkä / 7
Kasvuhalkeamat: hieman herkkä / 7
Sadonkorjuuvauriot: hieman herkkä / 7
Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
Bentazon: melko herkkä / 6,5
Etyleni: 5-15 % enemmän mukuloita / 6
Vedenalainen paino: 354
Kuiva-ainepitoisuus: 19,4%
Keittolaatu: kiinteä / A
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6
Raakatummuminen: melko herkkä / 6
Ranskalaisten laatu: keskiarvo / 6
Kuiva-aineen jakautuminen: erinomainen / 8
Prosessi laatu: sopimaton / 4
TGA-taso: 5,2

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi + 10 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi.

Siementen käsittely

Asianmukainen esiidätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

30/40 mm: 22 cm (60.500 taimia/ha)

40/50 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 4 °C. Soveltuu pitkäaikaiseen säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: hieman altis / 6

Virus - Yn: hieman altis / 6

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 6

Ruoste: hieman altis / 6

Perunarutto - varsisto: hyvin altis / 4,5

Perunarutto - mukula: hieman altis / 6

Fusarium: hieman altis / 6

Tavanomaninen rupi: hyvin altis / 4,5

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: hieman altis / 6,5

Musta piste: altis / 5

Syylätauti F1: kestävä* / 10*

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -