


# Gourmandine.



**Vähittäiskauppa**  
Salaatti  
Erikoisuudet

aikainen pääsato lajike ja salaattierikoisuus, jolla on houkutteleva, sileä kuori ja miellyttävä, täyteläinen maku.

- ▶ **Kiinteä ruoanlaitto**
- ▶ **Hieno esitys**
- ▶ **Hyvä varastoitavuus**



## characteristics

### Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Bretagne Plants  
Jalostaja: CHARLOTTE x ESTIMA  
Jalostajan oikeudet: 31-12-2032  
Taimi: 92 F 229-11

### Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: kesäperuna / 7  
Vaalea verson väri: punainen violetti / RV  
Kukkien väri: violetti / P  
Marjojen lukumäärä: keskiarvo / 6  
Lehdet - alkukehitys: keskiverto / 6  
Lehdet - lopullinen kehitys: keskiverto / 7  
Lehtipinta: melko kiinteä / 7  
Väri: keltainen / Y  
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5  
Kuorilaatu: hyvä / 7  
Mukulan muoto: pitkä soikea / LO  
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5  
Tuberisointi: melko korkea / 7  
Mukulan koko: melko suuri / 7  
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5  
Lepotila: pitkä / 8

### Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5  
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman herkkä / 7  
Kasvuhalkeamat: hieman herkkä / 7  
Sadonkorjuuvauriot: hieman herkkä / 7  
Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8  
Bentazon: melko herkkä / 6,5  
Etyleni: 5-15 % enemmän mukuloita / 6  
Vedenalainen paino: 354  
Kuiva-ainepitoisuus: 19,4%  
Keittolaatu: kiinteä / A  
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6  
Raakatummuminen: melko herkkä / 6  
Ranskalaisten laatu: keskiarvo / 6  
Kuiva-aineen jakautuminen: erinomainen / 8  
Prosessi laatu: sopimaton / 4  
TGA-taso: 5,2

# How to grow



[www.agricopotatoes.fi](http://www.agricopotatoes.fi)

## Lannoitus <sup>1</sup>

Typpi: normi + 10 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi.

## Siementen käsittely

Asianmukainen esiidätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

## Planting distance

30/40 mm: 22 cm (60.500 taimia/ha)

40/50 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

## Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

## Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

## Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

## Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 4 °C. Soveltuu pitkäaikaiseen säilytykseen.



## Kestävyydet

Virus - Leaf roll: hieman altis / 6

Virus - Yn: hieman altis / 6

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 6

Ruoste: hieman altis / 6

Perunarutto - varsisto: hyvin altis / 4,5

Perunarutto - mukula: hieman altis / 6

Fusarium: hieman altis / 6

Tavanomaninen rupi: hyvin altis / 4,5

Say potato,  
say Agrico.

Kuorirokko: hieman altis / 6,5

Musta piste: altis / 5

Syylätauti F1: kestävä\* / 10\*

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -