

Jacky.

Aikainen pääsato, pienikokoinen ruokalajike, jolla on korkea sato ja joka on vastustuskykyinen perunaruttoon vastaan lehdissä ja mukuloissa.

- ▶ **Melko jauhoinen keittolaatu**
- ▶ **Korkea mukuloituminen**
- ▶ **Hyvä sietokyky mustelmia ja vaurioita vastaan**



Luomu



Vähittäiskauppa
Pakkaus
Pikku perunat



Kuori



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Lantmännen Seed B.V.
Jalostaja: ANOUK x ATHLETE
Jalostajan oikeudet: 31-12-2049
Taimi: SW 09-0557

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: kesäperuna / 6,5
Vaalea verson väri: vihreä punainen / GR
Kukkien väri: vaalean violetti / LP
Marjojen lukumäärä: alle keskiarvon / 6,5
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7,5
Lehdet - lopullinen kehitys: melko hyvä / 7,5
Lehtipinta: melko kiinteä / 7
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
Kuorilaatu: keskimääräistä parempi / 6,5
Mukulan muoto: pyöreä soikea / RO
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Tuberisointi: korkea / 9
Mukulan koko: keskiverto / 6,5
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6
Lepotila: melko lyhyt / 5,5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman tai ei herkkä / 8
Kasvuhalkeamat: melko herkkä / 6,5
Sadonkorjuuvauriot: hieman tai ei herkkä / 8
Metribuzin: melko herkkä / 6,5
Metribuzin: hieman herkkä / 7
Bentazon: - / -
Etyleeni: 15-25 % enemmän mukuloita / 7
Vedenalainen paino: 368
Kuiva-ainepitoisuus: 20,1%
Keittolaatu: melko jauhoinen / B
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6,5
Raakatumminen: melko herkkä / 6
Ranskalaisten laatu: alle keskiarvon / 5,5
Kuiva-aineen jakautuminen: hyvä / 7
Prosessi laatu: sopimaton / 5
TGA-taso: 14,05

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi.

Fosfori: normi.

Kalium: normi.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Itujen poistamisella voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67.000 taimia/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Kestävydet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: altis / 5

Virus - Yntn (mukula): hieman tai ei herkkä / 8

Ruoste: hieman altis / 6

Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 9

Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 9

Fusarium: altis / 5,5

Tavanomainen rupi: altis / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: hyvin altis / 2

Musta piste: hieman altis / 6

Syylätauti F1: - / -

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -