

Kuras.

Tärkkelystuotantoon tarkoitettu pääsatolajike, joka kestää peruna-ankeeroisia ja tuottaa erittäin hyvän tärkkelyssadon.



Teollisuus
Tärkkelys

- ▶ **Valkoinen lihan väri**
- ▶ **Hyvä varastoitavuus**
- ▶ **Hyvä vastustuskyky viruksia ja perunaruttoa vastaan**



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: G. Kuper
Jalostaja: PG 285 x AR 69-0491
Jalostajan oikeudet: Vanhentunut
Taimi: KU 80-1271

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: pääsato / 4
Vaalea verson väri: sininen violetti / BV
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: erittäin korkea / 4
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7
Lehdet - lopullinen kehitys: melko hyvä / 7,5
Lehtipinta: melko kiinteä / 7,5
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: valkoinen / 4,5
Kuorilaatu: melko huono / 5
Mukulan muoto: pyöreä soikea / RO
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6
Tuberisointi: keskiarvo / 6
Mukulan koko: melko suuri / 7,5
Koon säännöllisyys: tavanomainen / 7
Lepotila: melko lyhyt / 5,5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6
Musta piste (sisäinen mustelma): melko herkkä / 6
Kasvuhalkeamat: hieman herkkä / 7
Sadonkorjuuvauriot: herkkä / 5,5
Metribuzin: hieman herkkä / 7
Metribuzin: hieman herkkä / 7
Bentazon: - / -
Etyleeni: - / -
Vedenalainen paino: 490
Kuiva-ainepitoisuus: 25,9%
Keittolaatu: jauhoinen / C
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): erittäin herkkä / 4,5
Raakatumminen: - / -
Ranskalaisten laatu: alle keskiarvon / 5,5
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: sopimaton / 4,5
TGA-taso: 33,8

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi + 5 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 10 %.

Siementen käsittely

Asianmukainen esiidätys ylimmän verson poistamisen jälkeen voi vaikuttaa myönteisesti mukuloiden kasvuun. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 taimia/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Taimentulon jälkeen metribusiinin (Sencor) tavanomainen käyttö voi aiheuttaa jonkin verran reaktioita lehdistä, mutta harvoin sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Suosittelaa ennaltaehkäisevää ruiskutussuunnitelmaa perunaruttoa vastaan.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Soveltuu keskipitkään säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: hieman altis / 7

Virus - Yn: hieman tai ei herkkä / 8

Virus - Yntn (mukula): hieman tai ei herkkä / 9

Ruoste: hieman altis / 6,5

Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 8

Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 8

Fusarium: hieman altis / 7

Tavanomaninen rupi: altis / 5,5

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: hieman altis / 6,5

Musta piste: - / -

Syylätauti F1: kestävä / 10

Syylätauti F6: melko altis / 5

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: kestävä / 9

Valkoinen ankeroinen Pa 2: - / -

Valkoinen ankeroinen Pa 3: - / -