

Nofy.

Tärkkelyslajike, jolla on hyvä sato ja joka on vastustuskykyinen perunaruttoa vastaan lehdissä ja mukuloissa.

- » Korkea kuiva-ainepitoisuus
- » Hyvä varastoitavuus
- » Hyvä virusten vastustuskyky



Luomu



Teollisuus
Tärkkelys



Ominaisuudet

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: AKV Langholt
 Jalostaja: STAYER x AR 02-3921
 Jalostajan oikeudet: 31-12-2048
 Taimi: PL 08-4007

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: pääsato / 5
 Vaalea version väri: vihreä punainen / GR
 Kukkien väri: valkoinen / W
 Marjojen lukumäärä: alle keskiarvon / 7
 Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7,5
 Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
 Lehtipinta: melko kiinteä / 7,5
 Väri: keltainen / Y
 Lihan väri: vaaleankeltainen / 6,5
 Kuorilaatu: melko huono / 5
 Mukulan muoto: soikea pyöreä / OR
 Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
 Tuberisointi: melko korkea / 7
 Mukulan koko: melko suuri / 7,5
 Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
 Lepotila: melko pitkä / 7,5

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5
 Musta piste (sisäinen mustelma): melko herkkä / 6
 Kasvuhalkeamat: hieman tai ei herkkä / 8
 Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6
 Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
 Metribuzin: hieman tai ei herkkä / 8
 Bentazon: hieman tai ei herkkä / 8
 Etyleeni: 15-25 % enemmän mukuloita / 7
 Vedenalainen paino: 471
 Kuiva-ainepitoisuus: 25,2%
 Keittolaatu: jauhoinen / BC
 Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6,5
 Raakatumminen: - / -
 Ranskalaisten laatu: sopimaton / 4
 Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
 Prosessi laatu: sopimaton / 4,5
 TGA-taso: 15,37


www.agricopotatoes.fi

Viljelyohjeet

Lannoitus ¹

Typpi: normi + 10 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 10 %.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Istutusetäisyys

28/35 mm: 23 cm (58.000 taimia/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.000 taimia/ha)

Rikkaruohot

Metributsiinin (Sencor) tavanomainen käyttö ei aiheuta lehtien reaktioita tai sadon vähenemistä.

Sienitautien torjunta-aineet

Huolimatta perunaruton vastustuskyvystä, pysy valppaana tartuntojen varalta.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Soveltuu pitkäaikaiseen säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: hieman altis / 6,5

Virus - Yntn (mukula): hieman tai ei herkkä / 9

Ruoste: hyvin altis / 4,5

Perunarutto - varsisto: hieman tai ei herkkä / 9

Perunarutto - mukula: hieman tai ei herkkä / 8,5

Fusarium: - / -

Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Say potato,
say Agrico.

Kuorirokko: hyvin altis / 4,5

Musta piste: hieman tai ei herkkä / 8

Syylätauti F1: - / -

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: kestävä / 9

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: kohtalaisen altis / 6

Valkoinen ankeroinen Pa 2: kohtalaisen altis / 5

Valkoinen ankeroinen Pa 3: altis / 2