

Thalia.

Pääkasvina viljeltävä lajike, jolla on miellyttävä kuori, pitkä lepoaika ja hyvä vastustuskyky sukkulamatoja vastaan

- ▶ **Miellyttävä keltainen mallon väri**
- ▶ **Kiinteä kypsennettynä**
- ▶ **Soveltuu pitkäaikaiseen varastointiin**



Vähittäiskauppa
Pakkaus



Kuori



characteristics

Yleiset ominaisuudet

Jalostaja: Lantmännen Seed B.V.
Jalostaja: BELANA x AR 01-3576
Jalostajan oikeudet: 31-12-2051
Taimi: SW 10-8218

Kasvin ja mukulan ominaisuudet

Kypsyys: aikainen pääsato / 5,5
Vaalea verson väri: punainen / R
Kukkien väri: valkoinen / W
Marjojen lukumäärä: keskimääräistä korkeampi / 5,5
Lehdet - alkukehitys: melko nopea / 7
Lehdet - lopullinen kehitys: hyvä / 8
Lehtipinta: melko kiinteä / 7,5
Väri: keltainen / Y
Lihan väri: keltainen / 7
Kuorilaatu: keskimääräistä parempi / 6,5
Mukulan muoto: soikea / O
Mukulan muodon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Tuberisointi: melko korkea / 7
Mukulan koko: melko suuri / 7
Koon säännöllisyys: melko säännöllisesti / 6,5
Lepotila: pitkä / 8

Herkkyys ja laatu

Toissijainen kasvu: melko herkkä / 6,5
Musta piste (sisäinen mustelma): hieman herkkä / 7
Kasvuhalkeamat: hieman tai ei herkkä / 8
Sadonkorjuuvauriot: melko herkkä / 6
Metribuzin: melko herkkä / 6
Metribuzin: melko herkkä / 6,5
Bentazon: - / -
Etyleeni: 5-15 % enemmän mukuloita / 6
Vedenalainen paino: 385
Kuiva-ainepitoisuus: 21%
Keittolaatu: kiinteä / A
Harmaa värimuutos (keittämisen jälkeen): melko herkkä / 6,5
Raakatummuminen: melko herkkä / 6,5
Ranskalaisten laatu: keskiarvo / 6
Kuiva-aineen jakautuminen: - / -
Prosessi laatu: sopimaton / 5
TGA-taso: 3,3

How to grow



www.agricopotatoes.fi

Lannoitus ¹

Typpi: normi + 15 %.

Fosfori: normi.

Kalium: normi + 15 %.

Siementen käsittely

Voidaan istuttaa suoraan kylmävarastosta, mieluiten lyhyen lämpöshokin jälkeen. Useammin kuin kerran tapahtuvalla idunpoistolla voi olla kielteinen vaikutus satoon ja mukulakokoon.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

Rikkaruohot

Älä käytä metributsiinia (Sencor), koska se aiheuttaa vakavia lehtivaurioita ja vähentää satoa huomattavasti.

Sienitautien torjunta-aineet

Ennaltaehkäisevä ruiskutusohjelma perunaruttoa vastaan on tarpeen.

Sadonkorjuu

Koska lajike on herkkä mustalaikulle ja/tai sadonkorjuuvaurioille, odota vähintään kolme viikkoa varsistohävittämisen jälkeen ennen sadonkorjuuta.

Varastointilämpötila - Varastointiaika

Suosittelava säilytyslämpötila on 5 °C. Soveltuu pitkäaikaiseen säilytykseen.



Kestävyydet

Virus - Leaf roll: - / -

Virus - Yn: altis / 5

Virus - Yntn (mukula): hieman altis / 6,5

Ruoste: hieman altis / 6

Perunarutto - varsisto: altis / 5

Perunarutto - mukula: hieman altis / 7,5

Fusarium: hieman tai ei herkkä / 8

Tavanomaninen rupi: hieman altis / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Kuorirokko: - / -

Musta piste: hyvin altis / 3,5

Syylätauti F1: hyvin altis / 1

Syylätauti F6: - / -

Syylätauti F18: - / -

Keltainen ankeroinen Ro 1/4: altis / 3

Keltainen ankeroinen Ro 2/3: altis / 2

Valkoinen ankeroinen Pa 2: kenttäkestävä / 8

Valkoinen ankeroinen Pa 3: kenttäkestävä / 7