
Jamaica (AR 14-0334).

Frais

Consommation

Une variété de pomme de terre précoce traditionnelle et de vente au détail avec une belle finition de peau et une bonne taille.

- **Bon rendement**
- **Belle finition de peau**
- **Bonne taille**



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: OS 07-0020 x SAVIOLA
Droits d'obtenteur: En attente
Code de semis: AR 14-0334

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: hâtive / 7,5
Couleur du germe: - / -
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: assez élevé / 5
Feuillage - développement initial: rapide / 8
Feuillage - développement final: assez bon / 7,5
Feuillage - tenue: moyenne / 6,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong long / OL
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: gros / 8
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: assez courte / 5,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: peu à pas sensible / 8
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: assez sensible / 6
Métribuzine: très sensible / 3
Métribuzine: très sensible / 3
Éthylène: - / -
Poids sous eau: 332
Matière sèche: 18,3%
Type de cuisson: assez ferme / AB
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6
Grisaillement: - / -
Fritabilité: - / -
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: - / -
Niveau de glyco-alcaloïde: -

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

PRÉCONISATIONS CULTURALES

Conseils de culture

www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard.Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un court choc thermique ou pré-germination est recommandé.

Densité de plantation

28/35 mm: 23 cm (58.000 plantes/ha)
35/55 mm: 30 cm (44.500 plantes/ha)

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine, car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.



Say potato, say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 6
Virus du mop top: peu sensible / 6,5
Mildiou du feuillage: très sensible / 3,5
Mildiou du tubercule: peu sensible / 6
Fusariose: - / -
Gale commune: sensible / 5,5
Gale poudreuse: - / -
Dartrose: - / -
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: sensible* / 1*
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Pays-Bas +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.fr