

Oregon (AR 14-3578).



**Industrie de
transformation**
Chips

Variété demi-hâtive pour une utilisation en chips, avec une bonne uniformité de la forme et de la taille des tubercules et une bonne teneur en matière sèche.

- ▶ **Forme et taille régulières**
- ▶ **Bonne qualité pour les chips, même après un long stockage**
- ▶ **Peu de défauts de tubercules**



characteristics

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: LEANDRA x VR 808
Droits d'obteneur: En attente
Code de semis: AR 14-3578

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: tardive / 5
Couleur du germe: - / -
Couleur de la fleur: mauve pâle / LP
Nombre de baies: - / -
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: plutôt moyenne / 5,5
Forme du tubercule: oblong rond / OR
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: peu sensible / 7
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: sensible / 5
Métribuzine: peu sensible / 7
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Éthylène: - / -
Poids sous eau: 465
Matière sèche: 24,9%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson: sensible / 5
Grisaillement: assez sensible / 6,5
Fritabilité: supérieure à la moyenne / 6,5
Répartition de la matière sèche: plutôt irrégulière / 5
Chipabilité: bonne / 7
Niveau de glyco-alcaloïde: -

CONSEILS DE CULTURE



www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard. De préférence en trois apports, dont le deuxième doit avoir lieu peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 10%.

Traitement de semence

Plantez de préférence les tubercules dans un sol réchauffé, car le démarrage de cette variété est lent.

Densité de plantation

30/50 mm: 30 cm (45.000 plants/ha)

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartoise et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 9 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.



Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu à pas sensible / 8

Virus - Y nécrotique (tubercule): - / -

Virus du mop top: sensible / 5

Mildiou du feuillage: très sensible / 4,5

Mildiou du tubercule: sensible / 5

Fusariose: - / -

Gale commune: peu sensible / 6,5

Gale poudreuse: - / -

Dartoise: - / -

Galle verruqueuse F1: très sensible* / 1*

Galle verruqueuse F6: très sensible* / 1*

Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: - / -

Nématode blanc Pa 2: - / -

Nématode blanc Pa 3: - / -

Say potato,
say Agrico.