
Oregon (AR 14-3578).

Variété de pomme de terre demi-hâtive pour une utilisation en chips, avec une bonne uniformité de la forme et de la taille des tubercules et une bonne teneur en matière sèche.

Industrie de transformation
Chips

- **Forme et taille régulières**
- **Bonne qualité pour les chips, même après un long stockage**
- **Peu de défauts de tubercules**



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: LEANDRA x VR 808
Droits d'obtenteur: En attente
Code de semis: AR 14-3578

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: tardive / 5
Couleur du germe: - / -
Couleur de la fleur: mauve pâle / LP
Nombre de baies: - / -
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: plutôt moyenne / 5,5
Forme du tubercule: oblong rond / OR
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: peu sensible / 7
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: sensible / 5
Métribuzine: peu sensible / 7
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Éthylène: - / -
Poids sous eau: 465
Matière sèche: 24,9%
Type de cuisson: plutôt farineuse / BC
Noircissement après cuisson: sensible / 5
Grisaillement: assez sensible / 6,5
Fritabilité: supérieure à la moyenne / 6,5
Répartition de la matière sèche: plutôt irrégulière / 5,5
Chipabilité: bonne / 7
Niveau de glyco-alcaloïde: -

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

PRÉCONISATIONS CULTURALES

Conseils de culture

www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard.De préférence en trois apports, dont le deuxième doit avoir lieu peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 10%.

Traitement de semence

Plantez de préférence les tubercules dans un sol réchauffé, car le démarrage de cette variété est lent.

Densité de plantation

30/40 mm: 26 cm (51.000 plantes/ha)
40/50 mm: 31 cm (43.000 plantes/ha)
50/60 mm: 35 cm (38.000 plantes/ha)

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 9 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.



Say potato, say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): - / -
Virus du mop top: sensible / 5
Mildiou du feuillage: très sensible / 4,5
Mildiou du tubercule: sensible / 5
Fusariose: - / -
Gale commune: peu sensible / 6,5

Gale poudreuse: - / -
Dartrose: - / -
Galle verruqueuse F1: très sensible* / 1*
Galle verruqueuse F6: très sensible* / 1*
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Pays-Bas +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.fr