

Feliz (SW 14-7008).



Frais
Vapeur

Une variété de type chair ferme demi-hâtive, avec des tubercules ovales et allongés, type culinaire A, et une forte résistance au virus Y.

- ▶ Belle finition de peau
- ▶ Type culinaire A
- ▶ Bonne résistance au virus Y



characteristics

Caractéristiques générales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
Croisement: LORELEY x SW 06-0296
Droits d'obteneur: En attente
Code de semis: SW 14-7008

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur du germe: - / -
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: - / -
Feuillage - développement initial: rapide / 8
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong long / OL
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: élevée / 8
Taille du tubercule: moyen / 6,5
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: peu à pas sensible / 8
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: peu à pas sensible / 8
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Éthylène: 5% à 15% de tubercules en plus / 6
Poids sous eau: 358
Matière sèche: 19,6%
Type de cuisson: ferme / A
Noircissement après cuisson: - / -
Grisaillement: très sensible / 4
Fritabilité: - / -
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: - / -
Niveau de glyco-alcaloïde: -

CONSEILS DE CULTURE



www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard. De préférence en trois apports, dont le deuxième doit avoir lieu peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un court choc thermique ou pré-germination est recommandé. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

30/50 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartoise et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à un stockage à moyen terme.



Say potato,
say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu sensible / 7

Virus - Y nécrotique (tubercule): - / -

Virus du mop top: très sensible / 4

Mildiou du feuillage: très sensible / 3,5

Mildiou du tubercule: sensible / 5,5

Fusariose: - / -

Gale commune: sensible / 5

Gale poudreuse: - / -

Dartoise: - / -

Galle verruqueuse F1: résistante* / 10*

Galle verruqueuse F6: - / -

Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: sensible* / 4*

Nématode blanc Pa 2: moyennement sensible* / 5*

Nématode blanc Pa 3: sensible* / 3*