

Texas (AR 14-3488).



**Industrie de
transformation**
Frites

Variété demi-hâtive, à haut rendement,
destinée à l'industrie de la frite, adaptée
à différents types de sols.

- ▶ **Rendement élevé**
- ▶ **Teneur élevée en matière sèche**
- ▶ **Résistance multiple à la galle
verruqueuse**

Picture not yet available



characteristics

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: LEANDRA x AR 07-4113
Droits d'obteneur: En attente
Code de semis: AR 14-3488

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur du germe: - / -
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: moyen / 6
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: plutôt moyenne / 5,5
Forme du tubercule: oblong long / OL
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: assez sensible / 6,5
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: sensible / 5
Métribuzine: peu sensible / 7
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Éthylène: - / -
Poids sous eau: 427
Matière sèche: 23%
Type de cuisson: farineuse / C
Noircissement après cuisson: peu sensible / 7,5
Grisaillement: très sensible / 4,5
Fritabilité: bonne / 7
Répartition de la matière sèche: moyenne / 6,5
Chipabilité: - / -
Niveau de glyco-alcaloïde: -

CONSEILS DE CULTURE



www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un court choc thermique ou pré-germination est recommandé. Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique.

Densité de plantation

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartoise et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.



Say potato,
say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu sensible / 6,5

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 6

Virus du mop top: très sensible / 4,5

Mildiou du feuillage: très sensible / 4

Mildiou du tubercule: sensible / 5,5

Fusariose: - / -

Gale commune: sensible / 5,5

Gale poudreuse: - / -

Dartoise: - / -

Galle verruqueuse F1: résistante / 10

Galle verruqueuse F6: résistante* / 10*

Galle verruqueuse F18: résistante / 10

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: - / -

Nématode blanc Pa 2: - / -

Nématode blanc Pa 3: - / -