PRÉCONISATIONS CULTURALES

Texas (AR 14-3488).

Variété de pomme de terre demi-hâtive, à haut rendement, destinée à l'industrie de la frite, adaptée à différents types de sols.

- **Rendement élevé**
- **Teneur élevée en matière sèche**
- **Résistance multiple à la galle verruqueuse**

Industrie de transformation
Frites



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: LEANDRA x AR 07-4113
Droits d'obtenteur: En attente
Code de semis: AR 14-3488

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur du germe: - / -
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: moyen / 6
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7,5
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: plutôt moyenne / 5,5
Forme du tubercule: oblong long / OL
Régularité de la forme: régulière / 7
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: peu sensible / 7
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: sensible / 5
Métribuzine: peu sensible / 7
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Éthylène: - / -
Poids sous eau: 427
Matière sèche: 23%
Type de cuisson: farineuse / C
Noircissement après cuisson: sensible / 5,5
Grisaillement: très sensible / 4,5
Fritabilité: excellente / 8
Répartition de la matière sèche: moyenne / 6,5
Chipabilité: - / -
Niveau de glyco-alcaloïde: -

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

PRÉCONISATIONS CULTURALES

Conseils de culture

www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard.Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique.

Densité de plantation

28/35 mm: 27 cm (50.000 plantes/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 plantes/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 plantes/ha)

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à stockage à long terme.



Say potato, say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu sensible / 6,5
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 6
Virus du mop top: sensible / 5
Mildiou du feuillage: très sensible / 4
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5
Fusariose: - / -
Gale commune: sensible / 5,5

Gale poudreuse: - / -
Dartrose: - / -
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: résistante* / 10*
Galle verruqueuse F18: résistante / 10
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: - / -
Nématode blanc Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Pays-Bas +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.fr