

Janick.

Variété de conservation féculière avec multiples résistances aux nématodes et résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.



Industrie de transformation
Féculé

Image:

► **Résistante au mildiou**

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: AKV Langholt

Croisement: SC 05-4661 x AR 02-3921

Code de semis: PL 13-0304

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: tardive / 4

Couleur du germe: - / -

Couleur de la fleur: violette / V

Nombre de baies: très élevé / 4

Feuillage - développement initial: rapide / 8

Feuillage - développement final: bon / 8

Feuillage - tenue: ferme / 8

Couleur de la peau: rouge / R

Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5

Finition de la peau: assez terne / 5

Forme du tubercule: oblong rond / OR

Régularité de la forme: régulière / 7

Tubérisation: assez élevée / 7

Taille du tubercule: gros / 8

Homogénéité de la taille: régulière / 7

Dormance: assez courte / 5,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6

Coups bleus: assez sensible / 6

Crevasses: peu sensible / 7

Endommagement à la récolte: sensible / 5

Métribuzine: peu sensible / 7,5

Métribuzine: peu à pas sensible / 8

Éthylène: 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau: 497

Matière sèche: 26,5%

Type de cuisson: farineuse / C

Noircissement après cuisson: - / -

Grisaillement: - / -

Fritabilité: - / -

Répartition de la matière sèche: - / -

Chipabilité: assez mauvaise / 5,5

Niveau de glyco-alcaloïde: 7,3 mg/100g

S_Harvestability: - / -


www.agricopotatoes.fr

Conseils de culture

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard - 10%. De préférence en trois apports, dont le deuxième doit avoir lieu peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 10%.

Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

28/35 mm: 25 cm (54.000 plantes/ha)

35/50 mm: 30 cm (45.000 plantes/ha)

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu à pas sensible / 8

Virus - Y nécrotique (tubercule): - / -

Virus du mop top: peu sensible / 6

Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 8

Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9

Fusariose: - / -

Gale commune: peu sensible / 6

Gale poudreuse: - / -

Dartrose: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Galle verruqueuse F1: très sensible* / 1*

Galle verruqueuse F6: très sensible* / 1*

Galle verruqueuse F18: très sensible* / 1*

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: moyennement sensible / 5

Nématode blanc Pa 2: moyennement sensible / 6

Nématode blanc Pa 3: sensible / 3