

# Saprodi.



**Industrie de  
transformation**  
Fécule

Image:

## Caractéristiques

### Caractéristiques générales

Croisement: SCARLET x SOFISTA

Droits d'obtenteur: 31-12-2044

Code de semis: SL 04-454

### Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: tardive / 4

Couleur de la fleur: blanche / W

Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7

Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5

Couleur de la peau: jaune / Y

Couleur de la chair: jaune beurre / 6

Finition de la peau: très terne / 4

Forme du tubercule: oblong rond / OR

Régularité de la forme: régulière / 7

Tubérisation: assez élevée / 7

Taille du tubercule: assez gros / 7,5

Homogénéité de la taille: assez régulière / 6

Dormance: moyenne / 6

### Sensibilité et qualité

Repousse: sensible / 5,5

Coups bleus: très sensible / 4,5

Crevasses: - / -

Endommagement à la récolte: assez sensible / 6,5

Métribuzine: - / -

Métribuzine: - / -

Poids sous eau: 554

Matière sèche: 29,3%

Type de cuisson: farineuse / C

Noircissement après cuisson: sensible / 5,5

Grisaillement: - / -

Fritabilité: très bonne / 7,5

Répartition de la matière sèche: - / -

Chipabilité: moyenne / 6

Niveau de glyco-alcaloïde: 6,4 mg/100g

S\_Harvestability: - / -


[www.agricopotatoes.fr](http://www.agricopotatoes.fr)

# Conseils de culture

## Fertilisation et traitement du plant <sup>1</sup>

**Azote:** conseil standard - 10%.Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.Il est possible d'utiliser du fumier.

**Phosphore:** conseil standard.

**Potasse:** conseil standard.

## Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique.Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

## Densité de plantation

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 plants/ha)

<sup>1</sup> Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

## Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

## Protection fongicide

Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

## Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

## Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 6 °C. Convient au stockage de court à moyen terme.

Image:

Say potato,  
say Agrico.

## Résistances

Virus - Enroulement: peu sensible / 7

Virus - Y: - / -

Virus - Y nécrotique (tubercule): - / -

Virus du mop top: sensible / 5

Mildiou du feuillage: sensible / 5

Mildiou du tubercule: peu sensible / 7

Fusariose: peu sensible / 6

Gale commune: sensible / 5,5

Gale poudreuse: peu sensible / 7

Dartrose: - / -

R\_PCN Tolerance: peu à pas sensible / 8

Galle verruqueuse F1: résistante / 10

Galle verruqueuse F6: résistante / 10

Galle verruqueuse F18: résistante / 10

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: résistante / 9

Nématode blanc Pa 2: résistante / 9

Nématode blanc Pa 3: résistante / 9