

Ailstar.

Variété féculière de conservation au bon rendement en fécule et résistante à divers types de gales verruqueuses.



Industrie de transformation
Fécule

Image:

- ▶ **Tubercules de gros calibres**
- ▶ **Forte teneur en matière sèche**
- ▶ **Résistances multiples**

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: J.L. Spijkman
Croisement: KURAS x SERESTA
Droits d'obteneur: 31-12-2045
Code de semis: SA 05-0204

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: tardive / 4,5
Couleur du germe: bleu violet / BV
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: très élevé / 4
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune pâle / 5
Finition de la peau: assez terne / 5
Forme du tubercule: oblong rond / RO
Régularité de la forme: assez régulière / 6
Tubérisation: assez élevée / 7
Taille du tubercule: assez gros / 7
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: très sensible / 4
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: sensible / 5
Méribuzine: peu à pas sensible / 8
Méribuzine: peu sensible / 7,5
Éthylène: 15% à 25% de tubercules en plus / 7
Poids sous eau: 508
Matière sèche: 27%
Type de cuisson: farineuse / C
Noircissement après cuisson: très sensible / 4
Grisaillement: - / -
Fritabilité: mauvaise / 4
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: mauvaise / 5
Niveau de glyco-alcaloïde: 10,1 mg/100g
S_Harvestability: - / -


www.agricopotatoes.fr

Conseils de culture

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard + 5%. Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 20%.

Traitement de semence

Un court choc thermique ou pré-germination est recommandé. Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation. Dégermer une fois est optionnel.

Densité de plantation

28/35 mm : 27 cm (50.000 plantes/ha)

35/55 mm : 33 cm (40.000 plantes/ha)

Allstar a de longs stolons, plantez donc la variété pas trop profondément.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartoise et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu à pas sensible / 8

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 9

Virus du mop top: peu sensible / 6

Mildiou du feuillage: peu sensible / 6

Mildiou du tubercule: peu sensible / 6,5

Fusariose: - / -

Gale commune: peu sensible / 6

Gale poudreuse: peu à pas sensible / 8

Dartoise: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Galle verruqueuse F1: assez résistante / 9

Galle verruqueuse F6: résistante / 10

Galle verruqueuse F18: assez résistante / 9

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: sensible / 4

Nématode blanc Pa 2: moyennement sensible / 6

Nématode blanc Pa 3: sensible / 4