

Ardeche.

Variété précoce de conservation, féculière, résistante au mildiou du feuillage et des tubercules et adaptée à la production de flocons.



Biologique



Industrie de transformation

Flocon
Fécule

Image:

- ▶ **Bon rendement féculier**
- ▶ **Résistances multiples aux nématodes à kyste de la pomme de terre**
- ▶ **Bonne résistance aux virus**

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: STAYER x AR 02-2139
Droits d'obteneur: 31-12-2048
Code de semis: AR 07-2451

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur du germe: vert rouge / GR
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: moyen / 6
Feuillage - développement initial: rapide / 8
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: très terne / 4
Forme du tubercule: oblong rond / RO
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: assez faible / 5
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: assez courte / 5,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: très sensible / 4,5
Crevasses: assez sensible / 6
Endommagement à la récolte: assez sensible / 6
Métribuzine: peu à pas sensible / 8
Métribuzine: peu à pas sensible / 8
Éthylène: 15% à 25% de tubercules en plus / 7
Poids sous eau: 474
Matière sèche: 25,3%
Type de cuisson: farineuse / C
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6,5
Grisaillement: - / -
Fritabilité: mauvaise / 4
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: moyenne / 6
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,7 mg/100g
S_Harvestability: - / -


www.agricopotatoes.fr

Conseils de culture

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard + 10%. Il est possible d'utiliser du fumier.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 20%.

Traitement de semence

Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

28/35 mm : 21 cm (64.000 plantes/ha)

35/55 mm : 26 cm (50.000 plantes/ha)

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartoise et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 8 °C. Convient à un stockage à moyen terme.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu sensible / 6

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8,5

Virus du mop top: peu sensible / 6

Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9

Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9

Fusariose: - / -

Gale commune: peu sensible / 6

Gale poudreuse: peu sensible / 6,5

Dartoise: peu sensible / 7

R_PCN Tolerance: - / -

Galle verruqueuse F1: peu sensible / 8

Galle verruqueuse F6: peu sensible / 8

Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: résistante / 9

Nématode blanc Pa 2: résistante / 9

Nématode blanc Pa 3: assez résistante / 7