# 

Variété primeur de consommation offrant un excellent rendement et idéale pour les frites maison.


- Excellente qualité de friture
- Très peu sensible aux endommagements à la récolte
- Résistances multiples





Frais





### characteristics

#### Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V. Croisement: RIANTA x RENSKA Droits d'obtenteur: 31-12-2029 Code de semis: AR 87-0039

## Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur du germe: vert / G
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: très élevé / 4

Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7,5

Feuillage - développement final: moyen / 7

Feuillage - tenue: moyenne / 6 Couleur de la peau: jaune / Y

Couleur de la chair: jaune beurre / 6

Finition de la peau: lisse / 7

Forme du tubercule: oblong long / OL Régularité de la forme: régulière / 7 Tubérisation: assez élevée / 7 Taille du tubercule: assez gros / 7 Homogénéité de la taille: régulière / 7

Dormance: assez courte / 5,5

#### Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5 Coups bleus: peu à pas sensible / 8

Crevasses: peu sensible / 7

Endommagement à la récolte: assez sensible / 6,5

**Métribuzine:** assez sensible / 6 **Métribuzine:** assez sensible / 6

Bentazone: - / -Éthylène: - / -Poids sous eau: 375

Matière sèche: 20,4%

Type de cuisson: légèrement farineuse / B Noircissement après cuisson: assez sensible / 6

**Grisaillement:** - / - **Fritabilité:** moyenne / 6

Répartition de la matière sèche: - / -

Chipabilité: moyenne / 6 Niveau de glyco-alcaloïde: 4,9



## How to grow

## Fertilisation et traitement du plant <sup>1</sup>

Azote: conseil standard + 10%. Phosphore: conseil standard. Potasse: conseil standard.

#### Traitement de semence

Plantez de préférence les tubercules dans un sol réchauffé, car le démarrage de cette variété est lent. Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation.

#### **Planting distance**

28/35 mm : 27 cm (50.000 plantes/ha) 35/55 mm : 33 cm (40.000 plantes/ha)

<sup>1</sup> Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

#### www.agricopotatoes.fr

#### Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

#### **Protection fongicide**

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

#### Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

## Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à un stockage à moyen terme.



#### Résistances

Virus - Enroulement: peu sensible / 7

Virus - Y: peu sensible / 6,5

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8

Virus du mop top: peu sensible / 6 Mildiou du feuillage: sensible / 5

Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 8

Fusariose: sensible / 5

Gale commune: sensible / 5,5



**Gale poudreuse:** sensible / 5,5 **Dartrose:** peu sensible / 7

Galle verruqueuse F1: résistante / 10

Galle verruqueuse F6: - / - Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: - / -Nématode blanc Pa 2: - / -Nématode blanc Pa 3: - / -

