

Variété de conservation à chair jaune, grande régularité de qualité et bon rendement, destinée à la transformation.

- Excellente qualité de friture
- Résistances à de multiples virus
- Bonne capacité de stockage







Industrie de transformation

> Frites Chips 4ème gamme

rais Consommation



characteristics

Caractéristiques générales

Obtenteur: R.K. Bakker
Croisement: AGRIA MUTANT
Droits d'obtenteur: 31-12-2046
Code de semis: BA 06-0001

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: tardive / 5

Couleur du germe: bleu violet / BV Couleur de la fleur: blanche / W

Nombre de baies: nul / 8

Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7

Feuillage - développement final: bon / 8

Feuillage - tenue: ferme / 8
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune / 7
Finition de la peau: moyenne / 6
Forme du tubercule: oblong long / OL
Régularité de la forme: régulière / 7

Tubérisation: moyenne / 6 **Taille du tubercule**: gros / 8

Homogénéité de la taille: régulière / 7

Dormance: longue / 8

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6 Coups bleus: assez sensible / 6 Crevasses: assez sensible / 6

Endommagement à la récolte: sensible / 5,5

Métribuzine: peu sensible / 7,5 Métribuzine: peu sensible / 7,5 Bentazone: peu sensible / 7,5

Éthylène: 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau: 401 Matière sèche: 21,7%

Type de cuisson: plutôt farineuse / BC

Noircissement après cuisson: peu sensible / 7

Grisaillement: peu sensible / 7 **Fritabilité:** excellente / 8

Répartition de la matière sèche: bonne / 7

Chipabilité: bonne / 7

Niveau de glyco-alcaloïde: 5,2





Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard - 10%. Phosphore: conseil standard. Potasse: conseil standard + 10%.

Traitement de semence

Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation. Dégermer une fois est optionnel.

Densité de plantation

28/35 mm : 25 cm (54.000 plantes/ha) 35/55 mm : 30 cm (44.000 plantes/ha) 50/55 mm : 38 cm (35.000 plantes/ha)

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

www.agricopotatoes.fr

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à stockage à long terme.



Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu sensible / 7,5

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7

Virus du mop top: peu sensible / 6,5 Mildiou du feuillage: sensible / 5,5 Mildiou du tubercule: peu sensible / 6,5

Fusariose: peu sensible / 7 **Gale commune:** sensible / 5



Gale poudreuse: - / -

Dartrose: très sensible / 4,5

Galle verruqueuse F1: résistante / 10

Galle verruqueuse F6: - / - Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: assez résistante / 8

Nématode doré Ro 2/3: - / -Nématode blanc Pa 2: - / -Nématode blanc Pa 3: - / -

