PRÉCONISATIONS CULTURALES

Levante.

Variété de conservation précoce, à haut rendement, présentant une belle peau jaune et résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.

- **Résistante au mildiou**
- **Belle peau**
- **Plante forte**
- **Résistances multiples**
- **Forte tubérisation**
- **Rendement élevé**

Biologique Frais Consommation



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: AR 01-3218 x ALMERA
Droits d'obtenteur: 31-12-2048
Code de semis: AR 07-3009

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur du germe: vert rouge / GR
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: assez élevé / 5,5
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6
Finition de la peau: lisse / 7
Forme du tubercule: oblong long / LO
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: élevée / 8
Taille du tubercule: assez gros / 7
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse: peu sensible / 7
Coups bleus: assez sensible / 6,5
Crevasses: peu sensible / 7
Endommagement à la récolte: assez sensible / 6
Métribuzine: assez sensible / 6,5
Métribuzine: sensible / 5,5
Éthylène: 5% de tubercules en moins / 4
Poids sous eau: 365
Matière sèche: 19,9%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson: peu sensible / 7
Grisaillement: sensible / 5,5
Fritabilité: assez mauvaise / 5,5
Répartition de la matière sèche: - / -
Chipabilité: mauvaise / 4,5
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,73 mg/100g

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

PRÉCONISATIONS CULTURALES

Conseils de culture

www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard.Apport fractionné de préférence, second apport peu après la tubérisation.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Plantez de préférence les tubercules dans un sol réchauffé, car le démarrage de cette variété est lent.Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.Un court choc thermique ou pré-germination est recommandé.

Densité de plantation

28/35 mm : 25 cm (53.000 plantes/ha)

35/55 mm : 30 cm (44.500 plantes/ha)

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.



Say potato, say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu sensible / 6

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8,5

Virus du mop top: très sensible / 4,5

Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 8,5

Mildiou du tubercule: peu sensible / 7,5

Fusariose: peu sensible / 6

Gale commune: sensible / 5

Gale poudreuse: peu sensible / 6,5

Dartrose: peu sensible / 7,5

Galle verruqueuse F1: - / -

Galle verruqueuse F6: - / -

Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: - / -

Nématode blanc Pa 2: - / -

Nématode blanc Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Pays-Bas +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.fr