Lugano.

Variété précoce de conservation, destinée à la transformation, à chair jaune, avec de bonnes résistances aux nématodes à kyste de la pomme de terre et à la galle verruqueuse.

- **Gros tubercules**
- **Résistances multiples**
- **Bonne aptitude au stockage**
- **Excellente aptitude à la friture**
- **Bonne dormance**

Industrie de transformation
Frites

Consommation



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: F.J. Vos
Croisement: AR 00-2211 x AR 99-0669
Droits d'obtenteur: 31-12-2048
Code de semis: VO 07-0289

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 5,5
Couleur du germe: rouge / R
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: assez faible / 7
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: moyenne / 6
Forme du tubercule: oblong long / OL
Régularité de la forme: assez régulière / 6
Tubérisation: assez faible / 5
Taille du tubercule: gros / 8
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: longue / 8

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6
Coups bleus: assez sensible / 6
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: très sensible / 4,5
Métribuzine: peu à pas sensible / 8
Métribuzine: peu sensible / 7,5
Éthylène: 5% à 15% de tubercules en plus / 6
Poids sous eau: 394
Matière sèche: 21,4%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson: assez sensible / 6,5
Grisaillement: assez sensible / 6
Fritabilité: excellente / 8
Répartition de la matière sèche: bonne / 7,5
Chipabilité: assez mauvaise / 5,5
Niveau de glyco-alcaloïde: 6,4 mg/100g

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

PRÉCONISATIONS CULTURALES

Conseils de culture

www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard.
Phosphore: conseil standard.
Potasse: conseil standard + 20%.

Traitement de semence

Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation.

Densité de plantation

28/35 mm : 22 cm (60.000 plantes/ha)
35/55 mm : 30 cm (45.000 plantes/ha)
50/55 mm : 36 cm (37.000 plantes/ha)

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme de pulvérisation préventif contre le mildiou est conseillé.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à stockage à long terme.



Say potato, say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: sensible / 5,5
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7,5
Virus du mop top: sensible / 5,5
Mildiou du feuillage: sensible / 5
Mildiou du tubercule: sensible / 5,5
Fusariose: sensible / 5,5
Gale commune: sensible / 5,5
Gale poudreuse: peu sensible / 7,5
Dartrose: peu sensible / 6
Galle verruqueuse F1: résistante / 10
Galle verruqueuse F6: assez résistante / 9
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: résistante / 9
Nématode blanc Pa 2: résistante / 9
Nématode blanc Pa 3: résistante / 9

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Pays-Bas +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.fr