

Spectra.

Variété primeur de pomme de terre de consommation, à haut rendement, avec une belle peau lisse et des tubercules de forme très homogène.


- ▶ **Gros tubercules**
- ▶ **Tubérisation élevée**
- ▶ **Tubercules de taille très uniforme**



Frais



Consommation



characteristics

Caractéristiques générales

Obtenteur: Lantmännen Seed B.V.
 Croisement: ARIELLE x SOFIA
 Droits d'obteneur: 31-12-2046
 Code de semis: SW 05-1431

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 7
 Couleur du germe: rouge violet / RV
 Couleur de la fleur: blanche / W
 Nombre de baies: très élevé / 4
 Feuillage - développement initial: rapide / 8
 Feuillage - développement final: assez bon / 7,5
 Feuillage - tenue: moyenne / 6,5
 Couleur de la peau: jaune / Y
 Couleur de la chair: jaune beurre / 6
 Finition de la peau: très lisse / 7,5
 Forme du tubercule: oblong rond / OR
 Régularité de la forme: régulière / 7,5
 Tubérisation: assez élevée / 7
 Taille du tubercule: assez gros / 7,5
 Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
 Dormance: assez courte / 5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
 Coups bleus: peu sensible / 7,5
 Crevasses: assez sensible / 6
 Endommagement à la récolte: assez sensible / 6
 Métribuzine: peu sensible / 7
 Métribuzine: peu sensible / 7,5
 Éthylène: 5% de tubercules en plus ou en moins / 5
 Poids sous eau: 324
 Matière sèche: 17,9%
 Type de cuisson: assez ferme / AB
 Noircissement après cuisson: assez sensible / 6
 Grisaillement: très sensible / 4
 Fritabilité: mauvaise / 4,5
 Répartition de la matière sèche: - / -
 Chipabilité: mauvaise / 4
 Niveau de glyco-alcaloïde: 4,7



How to grow

www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique. Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

28/35 mm : 27 cm (50.000 plantes/ha)

35/55 mm : 33 cm (40.000 plantes/ha)

Plantez Spectra un peu plus profondément que les autres variétés pour éviter que les tubercules ne verdissent.

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une certaine réaction du feuillage et une légère réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à un stockage à moyen terme.



Say potato,
say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu sensible / 6

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7

Virus du mop top: sensible / 5

Mildiou du feuillage: très sensible / 4,5

Mildiou du tubercule: peu sensible / 6

Fusariose: sensible / 5,5

Gale commune: sensible / 5

Gale poudreuse: très sensible / 4

Dartrose: sensible / 5

Galle verruqueuse F1: résistante / 10

Galle verruqueuse F6: - / -

Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: - / -

Nématode blanc Pa 2: - / -

Nématode blanc Pa 3: - / -