

Twister.

Variété de pomme de terre de consommation précoce, adaptée à la culture conventionnelle et biologique, résistante au mildiou du feuillage et des tubercules.

- ▶ **Résistante au mildiou**
- ▶ **Belle peau**
- ▶ **Bonne aptitude au stockage**
- ▶ **Forte résistance aux virus**



characteristics

Caractéristiques générales

Obtenteur: G.W. te Winkel
 Croisement: ARG 96-0739 x AR 02-9113
 Droits d'obteneur: 31-12-2048
 Code de semis: TW 08-1507

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 7
 Couleur du germe: rouge violet / RV
 Couleur de la fleur: mauve pâle / LP
 Nombre de baies: assez élevé / 5,5
 Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
 Feuillage - développement final: assez bon / 7,5
 Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7
 Couleur de la peau: jaune / Y
 Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
 Finition de la peau: lisse / 7
 Forme du tubercule: oblong rond / RO
 Régularité de la forme: régulière / 7
 Tubérisation: moyenne / 6,5
 Taille du tubercule: assez gros / 7
 Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
 Dormance: assez longue / 7

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
 Coups bleus: peu à pas sensible / 8
 Crevasses: assez sensible / 6,5
 Endommagement à la récolte: peu sensible / 7
 Métribuzine: très sensible / 3
 Métribuzine: très sensible / 3
 Éthylène: 5% de tubercules en moins / 4
 Poids sous eau: 345
 Matière sèche: 19%
 Type de cuisson: assez ferme / AB
 Noircissement après cuisson: assez sensible / 6,5
 Grisaillement: assez sensible / 6
 Fritabilité: mauvaise / 5
 Répartition de la matière sèche: - / -
 Chipabilité: mauvaise / 4
 Niveau de glyco-alcaloïde: 5,63

CONSEILS DE CULTURE



www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant ¹

Azote: conseil standard + 20%.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Peut être planté dès sa sortie de chambre froide, de préférence après un court choc thermique. Dégermer une fois est optionnel.

Densité de plantation

28/35 mm : 22 cm (60.500 plantes/ha)

35/50 mm : 25 cm (54.000 plantes/ha)

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine, car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Protection fongicide

Malgré sa résistance au mildiou, surveillez le risque d'infection.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 6 °C. Convient à un stockage de moyen à long terme.



Résistances

Virus - Enroulement: - / -

Virus - Y: peu à pas sensible / 8

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu à pas sensible / 8

Virus du mop top: peu sensible / 6

Mildiou du feuillage: peu à pas sensible / 9

Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 9

Fusariose: peu sensible / 6

Gale commune: peu sensible / 6

Say potato,
say Agrico.

Gale poudreuse: sensible / 5

Dartrose: peu sensible / 7

Galle verruqueuse F1: peu sensible / 8

Galle verruqueuse F6: - / -

Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: - / -

Nématode blanc Pa 2: - / -

Nématode blanc Pa 3: - / -