Sidney.

Variété de pomme de terre demi-précoce à la chair jaune pâle, convenant à une utilisation en frites industrielles.

Industrie de transformation
Frites

- **Tubercules de gros calibres**
- **Bonne résistance aux virus**
- **Bonne répartition de la matière sèche et adaptée au QSR**



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.
Croisement: LADY ANNA x AR 05-3392
Code de semis: AR 12-1680

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-tardive / 6
Couleur du germe: - / -
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: - / -
Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
Feuillage - développement final: assez bon / 7,5
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune pâle / 5
Finition de la peau: assez terne / 5
Forme du tubercule: oblong long / LO
Régularité de la forme: assez régulière / 6,5
Tubérisation: moyenne / 6
Taille du tubercule: assez gros / 7,5
Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5
Dormance: moyenne / 6,5

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: peu sensible / 7,5
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: peu sensible / 7
Métribuzine: assez sensible / 6,5
Métribuzine: assez sensible / 6,5
Éthylène: 5% de tubercules en plus ou en moins / 5
Poids sous eau: 396
Matière sèche: 21,5%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson: peu sensible / 7
Grisaillement: peu sensible / 7,5
Fritabilité: excellente / 8
Répartition de la matière sèche: excellente / 8,5
Chipabilité: - / -
Niveau de glyco-alcaloïde: 4,3 mg/100g

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

PRÉCONISATIONS CULTURALES

Conseils de culture

www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard.
Phosphore: conseil standard.
Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

28/35 mm: 26 cm (51.000 plantes/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 plantes/ha)
50/55 mm: 37 cm (36.000 plantes/ha)
Cut 50/60 mm: 34 cm (39.000 plants/ha)

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, n'utilisez pas de métribuzine, car elle peut provoquer une forte réaction du feuillage et une considérable réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins trois semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à un stockage à moyen terme.



Say potato, say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: - / -
Virus - Y: peu à pas sensible / 8
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7,5
Virus du mop top: peu à pas sensible / 8
Mildiou du feuillage: très sensible / 4
Mildiou du tubercule: peu à pas sensible / 8
Fusariose: peu sensible / 6
Gale commune: sensible / 5,5
Gale poudreuse: peu sensible / 6
Dartrose: sensible / 5,5
Galle verruqueuse F1: très sensible* / 1*
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: sensible / 4
Nématode blanc Pa 2: assez résistante / 8
Nématode blanc Pa 3: moyennement sensible / 6

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Pays-Bas +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.fr