


# Leonore (AR 13-1059).



Industrie de  
transformation  
Frites

Variété industrielle précoce faisant un bon rendement rapidement avec un bon niveau de matière sèche.

- ▶ **Variété précoce**
- ▶ **Bonne résistance aux virus**
- ▶ **Tubercules oblongs longs avec une belle présentation**



## characteristics

### Caractéristiques générales

Obtenteur: Agrico Research B.V.

Croisement: EXCELLENCY x AR 06-3754

Code de semis: AR 13-1059

### Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: hâtive / 7,5

Couleur du germe: - / -

Couleur de la fleur: blanche / W

Nombre de baies: nul / 8

Feuillage - développement initial: rapide / 8

Feuillage - développement final: bon / 8

Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7

Couleur de la peau: jaune / Y

Couleur de la chair: jaune / 7

Finition de la peau: lisse / 7

Forme du tubercule: oblong long / LO

Régularité de la forme: assez régulière / 6

Tubérisation: moyenne / 6,5

Taille du tubercule: assez gros / 7,5

Homogénéité de la taille: assez régulière / 6,5

Dormance: moyenne / 6

### Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5

Coups bleus: peu à pas sensible / 8

Crevasses: assez sensible / 6,5

Endommagement à la récolte: assez sensible / 6,5

Métribuzine: assez sensible / 6,5

Métribuzine: peu sensible / 7

Bentazone: - / -

Éthylène: 5% de tubercules en plus ou en moins / 5

Poids sous eau: 397

Matière sèche: 21,5%

Type de cuisson: plutôt farineuse / BC

Noircissement après cuisson: peu sensible / 7

Grisaillement: très sensible / 4,5

Fritabilité: bonne / 7

Répartition de la matière sèche: bonne / 7,5

Chipabilité: - / -

Niveau de glyco-alcaloïde: 6,7

# How to grow



[www.agricopotatoes.fr](http://www.agricopotatoes.fr)

## Fertilisation et traitement du plant <sup>1</sup>

**Azote:** conseil standard + 10%.  
**Phosphore:** conseil standard.  
**Potasse:** conseil standard.

## Traitement de semence

Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

## Planting distance

28/35 mm: 24 cm (55.000 plantes/ha)  
 35/55 mm: 31 cm (42.000 plantes/ha)  
 Plantez Leonore un peu plus profondément que les autres variétés pour éviter que les tubercules ne verdissent.

<sup>1</sup> Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

## Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine peut provoquer une légère réaction du feuillage, mais rarement une réduction du rendement.

## Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

## Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

## Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.



Say potato,  
say Agrico.

## Résistances

**Virus - Enroulement:** - / -  
**Virus - Y:** peu sensible / 7,5  
**Virus - Y nécrotique (tubercule):** peu sensible / 6  
**Virus du mop top:** sensible / 5,5  
**Mildiou du feuillage:** très sensible / 3,5  
**Mildiou du tubercule:** sensible / 5  
**Fusariose:** peu sensible / 6  
**Gale commune:** peu sensible / 6

**Gale poudreuse:** très sensible / 3  
**Dartrose:** sensible / 5  
**Galle verruqueuse F1:** résistante / 10  
**Galle verruqueuse F6:** - / -  
**Galle verruqueuse F18:** - / -  
**Nématode doré Ro 1/4:** résistante / 9  
**Nématode doré Ro 2/3:** - / -  
**Nématode blanc Pa 2:** - / -  
**Nématode blanc Pa 3:** - / -