

# Riviera.



Consommation

Variété primeur de consommation à la belle peau, avec une bonne tolérance à la chaleur, une bonne résistance aux virus et un bon rendement précoce.

- ▶ **Gros tubercules**
- ▶ **Bel aspect**
- ▶ **Bonne résistance aux virus**



## characteristics

### Caractéristiques générales

Obtenteur: Mts. Boerhave  
 Croisement: MINERVA x ALCMARIA  
 Droits d'obteneur: 31-12-2030  
 Code de semis: BH 86-0266

### Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: très hâtive / 8  
 Couleur du germe: bleu violet / BV  
 Couleur de la fleur: blanche / W  
 Nombre de baies: très élevé / 4  
 Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7  
 Feuillage - développement final: moyen / 7  
 Feuillage - tenue: moyenne / 6,5  
 Couleur de la peau: jaune / Y  
 Couleur de la chair: jaune beurre / 6  
 Finition de la peau: excellente / 8  
 Forme du tubercule: oblong rond / OR  
 Régularité de la forme: assez régulière / 6  
 Tubérisation: assez faible / 5  
 Taille du tubercule: assez gros / 7,5  
 Homogénéité de la taille: régulière / 7  
 Dormance: moyenne / 6

### Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5  
 Coups bleus: peu à pas sensible / 8  
 Crevasses: assez sensible / 6,5  
 Endommagement à la récolte: assez sensible / 6  
 Métribuzine: peu à pas sensible / 8  
 Métribuzine: peu à pas sensible / 8  
 Éthylène: 5% à 15% de tubercules en plus / 6  
 Poids sous eau: 318  
 Matière sèche: 17,7%  
 Type de cuisson: assez ferme / AB  
 Noircissement après cuisson: sensible / 5,5  
 Grisaillement: - / -  
 Fritabilité: mauvaise / 4,5  
 Répartition de la matière sèche: - / -  
 Chipabilité: mauvaise / 4  
 Niveau de glyco-alcaloïde: 4,8



[www.agricopotatoes.fr](http://www.agricopotatoes.fr)

# How to grow

## Fertilisation et traitement du plant <sup>1</sup>

**Azote:** conseil standard + 10%.  
**Phosphore:** conseil standard.  
**Potasse:** conseil standard.

## Traitement de semence

Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

## Densité de plantation

28/35 mm : 22 cm (60.500 plantes/ha)  
 35/55 mm : 27 cm (50.000 plantes/ha)

<sup>1</sup> Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

## Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

## Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

## Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

## Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.



Say potato,  
say Agrico.

## Résistances

**Virus - Enroulement:** peu sensible / 7  
**Virus - Y:** peu à pas sensible / 8  
**Virus - Y nécrotique (tubercule):** peu sensible / 7  
**Virus du mop top:** très sensible / 4  
**Mildiou du feuillage:** très sensible / 3  
**Mildiou du tubercule:** sensible / 5  
**Fusariose:** peu sensible / 6  
**Gale commune:** sensible / 5,5

**Gale poudreuse:** très sensible / 2  
**Dartrose:** sensible / 5,5  
**Galle verruqueuse F1:** résistante / 10  
**Galle verruqueuse F6:** - / -  
**Galle verruqueuse F18:** - / -  
**Nématode doré Ro 1/4:** résistante / 9  
**Nématode doré Ro 2/3:** - / -  
**Nématode blanc Pa 2:** - / -  
**Nématode blanc Pa 3:** - / -