


Riviera.

Variété primeur de consommation à la belle peau, avec une bonne tolérance à la chaleur, une bonne résistance aux virus et un bon rendement précoce.



Consommation



- ▶ Gros tubercules
- ▶ Bel aspect
- ▶ Bonne résistance aux virus

characteristics

Caractéristiques générales

Obtenteur: Mts. Boerhave
 Croisement: MINERVA x ALCMARIA
 Droits d'obtenteur: 31-12-2030
 Code de semis: BH 86-0266

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: très hâtive / 8
 Couleur du germe: bleu violet / BV
 Couleur de la fleur: blanche / W
 Nombre de baies: très élevé / 4
 Feuillage - développement initial: plutôt rapide / 7
 Feuillage - développement final: moyen / 7
 Feuillage - tenue: moyenne / 6,5
 Couleur de la peau: jaune / Y
 Couleur de la chair: jaune beurre / 6
 Finition de la peau: excellente / 8
 Forme du tubercule: oblong rond / OR
 Régularité de la forme: assez régulière / 6
 Tubérisation: assez faible / 5
 Taille du tubercule: assez gros / 7,5
 Homogénéité de la taille: régulière / 7
 Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
 Coups bleus: peu à pas sensible / 8
 Crevasses: assez sensible / 6,5
 Endommagement à la récolte: assez sensible / 6
 Métribuzine: peu à pas sensible / 8
 Métribuzine: peu à pas sensible / 8
 Bentazone: - / -
 Éthylène: 5% à 15% de tubercules en plus / 6
 Poids sous eau: 318
 Matière sèche: 17,7%
 Type de cuisson: assez ferme / AB
 Noircissement après cuisson: sensible / 5,5
 Grisaillement: - / -
 Fritabilité: mauvaise / 4,5
 Répartition de la matière sèche: - / -
 Chipabilité: mauvaise / 4
 Niveau de glyco-alcaloïde: 4,8

How to grow



www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant¹

Azote: conseil standard + 10%.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard.

Traitement de semence

Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation. Un deuxième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

28/35 mm : 22 cm (60.500 plantes/ha)

35/55 mm : 27 cm (50.000 plantes/ha)

¹ Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 4 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.



**Say potato,
say Agrico.**

Résistances

Virus - Enroulement: peu sensible / 7

Virus - Y: peu à pas sensible / 8

Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7

Virus du mop top: très sensible / 4

Mildiou du feuillage: très sensible / 3

Mildiou du tubercule: sensible / 5

Fusariose: peu sensible / 6

Gale commune: sensible / 5,5

Gale poudreuse: très sensible / 2

Dartrose: sensible / 5,5

Galle verruqueuse F1: résistante / 10

Galle verruqueuse F6: - / -

Galle verruqueuse F18: - / -

Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9

Nématode doré Ro 2/3: - / -

Nématode blanc Pa 2: - / -

Nématode blanc Pa 3: - / -