Sinora.

Variété primeur de pomme de terre, à haut rendement et facile à cultiver pour une récolte précoce destinée au secteur des frites ou chips.

- **Récolte précoce**
- **Forte teneur en matière sèche**
- **Bonne résistance aux virus**

Industrie de transformation
Frites
Chips



Caractéristiques

Caractéristiques générales

Obtenteur: J. Schilt
Croisement: AGRIA x AM 70-2166
Droits d'obtenteur: 31-12-2027
Code de semis: SI 85-0482

Caractéristiques de la plante et des tubercules

Maturité: demi-hâtive / 7
Couleur du germe: bleu violet / BV
Couleur de la fleur: blanche / W
Nombre de baies: très élevé / 4
Feuillage - développement initial: rapide / 8
Feuillage - développement final: bon / 8
Feuillage - tenue: plutôt ferme / 7,5
Couleur de la peau: jaune / Y
Couleur de la chair: jaune beurre / 6,5
Finition de la peau: moyenne / 6
Forme du tubercule: oblong rond / OR
Régularité de la forme: assez régulière / 6
Tubérisation: assez élevée / 7
Taille du tubercule: assez gros / 7
Homogénéité de la taille: régulière / 7
Dormance: moyenne / 6

Sensibilité et qualité

Repousse: assez sensible / 6,5
Coups bleus: assez sensible / 6,5
Crevasses: assez sensible / 6,5
Endommagement à la récolte: très sensible / 4,5
Métribuzine: peu à pas sensible / 8
Métribuzine: peu à pas sensible / 8
Éthylène: - / -
Poids sous eau: 416
Matière sèche: 22,6%
Type de cuisson: légèrement farineuse / B
Noircissement après cuisson: sensible / 5
Grisaillement: sensible / 5
Fritabilité: excellente / 8
Répartition de la matière sèche: bonne / 7
Chipabilité: bonne / 7
Niveau de glyco-alcaloïde: 8,2 mg/100g

Agrico a pris toutes les précautions pour la réalisation de ces fiches descriptives. Toutefois veuillez noter qu toute information peut être sujette à modification et que Agrico n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les ommissions. En aucun cas nous ne pourrions être tenu responsable des dommages résultant ou liés aux informations contenues dan ces fiches.

AGRICO

PRÉCONISATIONS CULTURALES

Conseils de culture

www.agricopotatoes.fr

Fertilisation et traitement du plant [1]

Azote: conseil standard + 10%.L'utilisation de fumier est déconseillée.

Phosphore: conseil standard.

Potasse: conseil standard + 10%.

Traitement de semence

Un bon processus de pré-germination après avoir retiré le germe du dessus peut accroître la tubérisation.Un troisième dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre.

Densité de plantation

28/35 mm : 25 cm (54.000 plantes/ha)
35/55 mm : 33 cm (40.000 plantes/ha)

[1] Le niveau de fertilisation est basé sur l'analyse du sol.

Désherbage

Après la levée, un usage standard de métribuzine ne provoque pas de réaction du feuillage ni de réduction du rendement.

Protection fongicide

Un programme strict de pulvérisation contre le mildiou est nécessaire.

Récolte

En raison de ses caractéristiques variétales à la dartrose et aux endommagements, attendez au moins deux semaines après le défanage pour récolter.

Température de stockage - Durée de stockage

La température de stockage conseillée est de 5 °C. Pour le marché de la transformation, ne pas stocker au-dessous de 7 °C. Convient à une livraison directe ou au stockage à court terme.



Say potato, say Agrico.

Résistances

Virus - Enroulement: peu sensible / 6
Virus - Y: peu sensible / 7
Virus - Y nécrotique (tubercule): peu sensible / 7
Virus du mop top: peu sensible / 6
Mildiou du feuillage: très sensible / 4,5
Mildiou du tubercule: sensible / 5
Fusariose: peu sensible / 6
Gale commune: sensible / 5,5
Gale poudreuse: sensible / 5
Dartrose: - / -
Galle verruqueuse F1: - / -
Galle verruqueuse F6: - / -
Galle verruqueuse F18: - / -
Nématode doré Ro 1/4: résistante / 9
Nématode doré Ro 2/3: - / -
Nématode blanc Pa 2: sensible / 4
Nématode blanc Pa 3: sensible / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • Pays-Bas +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl www.agricopotatoes.fr