

Vogue.

Srednje rana sorta s ujednačenim i krupnim gomoljima.



Tradicionalni

- ▶ **Pretežno čvrsta prilikom kuhanja**
- ▶ **Krupni gomolji**
- ▶ **Rano zemetanje gomolja**



Karakteristike

Opće karakteristike

Uzgajivač: Konst Research B.V.

Križanje: MARABEL x AMOROSA

Autorsko pravo: 31-12-2046

Sjeme: KO 03-2027

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje rana berba / 6,5

Svijetla boja klice: zeleno crvena / GR

Boja cvijeta: bijela / W

Broj bobica: vrlo visok / 4

Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7

Krajnji razvoj lisne mase: sasvim dobro / 7,5

Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7

Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6

Boja pokožice: žuta / Y

Boja mesa: žuta / 7

Glatkoća pokožice: prosječan / 6

Oblik gomolja: ovalno izduženi / OL

Ujednačenost oblika gomolja: pravilan / 7

Tuberizacija: umjereno mali / 5,5

Krupnoća gomolja: krupan / 8

Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

Dormantnost: umjereno kratka / 5

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5

Nagnječenje (unutarnje): malo do neosjetljiv / 8

Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5

Oštećenje prilikom berbe: umjereno osjetljiv / 6

Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8

Metribuzin: malo osjetljiv / 7,5

Bentazon: malo osjetljiv / 7

Etilen: 5% manje do 5% više gomolja / 5

Podvodna težina: 311

Postotak suhe tvari: 17,3%

Kulinarški tip: umjereno čvrst / AB

Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): malo osjetljiv / 7,5

Oksidacija sirovog krumpira: - / -

Kvaliteta prženih krumpirića: nije pogodan / 5

Raspodjela suhe tvari: - / -

Čips kvaliteta: nije pogodan / 4

TGA razina: 3,7

Karvonsko ulje: 25% više gomolja / 8


www.interagrico.hr

Preporuke za uzgoj

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke - 10%. Preporučuje se split aplikacija, druga aplikacija ubrzo nakon zamatavanja gomolja.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 10%.

Tretiranje sjemena

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zamatavanje gomolja. Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Razmak sadnje

28/35 mm: 22 cm (60.500 plants/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

¹ Gnojidba se temelji na analizi tla

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.



Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - Yn: umjereno osjetljiv / 6,5

Virus - Yntn (gomolj): osjetljiv / 5

Prskanje: vrlo osjetljiv / 4

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 4

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno osjetljiv / 6

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6,5

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: vrlo osjetljiv / 2

Virus - A: - / -

Say potato,
say Agrico.

Virus - X: umjereno do neosjetljiv / 8

Nagnječenje: vrlo osjetljiv / 4,5

Erwinia (crna noga): - / -

Bradavičasta bolest krumpira F1: malo osjetljiv / 9

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -



InterAgrico • Generalni zastupnik i distributer za Hrvatsku • I. Mažuranića 2/I

HR 40000 Čakovec ☎ +385 (0)40 314 187 ✉ interagrico@interagrico.hr

🌐 www.interagrico.hr

