

Evolution.



Tradicionalni

Srednja rana sorta atraktivne tamnocrvene boje pokožice dobrog prinosa.

Image:

- ▶ **Krupni gomolji**
- ▶ **Dobro podnosi sušu**
- ▶ **Otporan na više tipova krumpirove cistolike nematode**

characteristics

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
 Križanje: AR 94-0807 x AMOROSA
 Autorsko pravo: 31-12-2042
 Sjeme: AR 99-0522

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje rana berba / 6,5
 Svijetla boja klice: zeleno crvena / GR
 Boja cvijeta: svjetloljubičasta / LP
 Broj bobica: iznadprosječan / 5
 Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7,5
 Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8
 Lisna masa - čvrstoća: prosječno / 6,5
 Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7
 Boja pokožice: crvena / R
 Boja mesa: svjetložuta / 6
 Glatkoća pokožice: dobar / 7
 Oblik gomolja: ovalno izduženi / OL
 Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6
 Tuberizacija: umjereno velik / 7
 Krupnoća gomolja: krupan / 8
 Ujednačenost veličine gomolja: umjereno pravilan / 6,5
 Dormantnost: kratka / 4

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6
 Nagnječenje (unutarnje): malo osjetljiv / 7
 Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6
 Oštećenje prilikom berbe: malo osjetljiv / 7
 Metribuzin: malo osjetljiv / 7
 Metribuzin: malo osjetljiv / 7,5
 Bentazon: malo osjetljiv / 7
 Etilen: 5% do 15% više gomolja / 6
 Podvodna težina: 343
 Postotak suhe tvari: 18,9%
 Kulinarski tip: umjereno brašnast / B
 Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): umjereno osjetljiv / 6
 Oksidacija sirovog krumpira: - / -
 Kvaliteta prženih krumpirića: nije pogodan / 4,5
 Raspodjela suhe tvari: - / -
 Čips kvaliteta: nije pogodan / 4
 TGA razina: 8
 Karvonsko ulje: 5% manje gomolja / 4

How to grow



Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke - 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke.

Tretiranje sjemena

Moguća je sadnja izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka (zagrijavanja). Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja može izazvati reakciju na lišću, ali rijetko utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za isporuku izravno s polja ili za kratkoročno skladištenje.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - Yn: osjetljiv / 5,5

Virus - Yntn (gomolj): umjereno osjetljiv / 7

Prskanje: osjetljiv / 5

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 4

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno osjetljiv / 6

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: umjereno osjetljiv / 6,5

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno osjetljiv / 7,5

Nagnječenje: umjereno osjetljiv / 6

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6

Bradavičasta bolest krumpira F1: umjereno osjetljiv / 8

Bradavičasta bolest krumpira F6: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: umjereno osjetljiv / 6

Nematoda Pa 2: otpornost u polju / 7

Nematoda Pa 3: umjereno osjetljiv / 5