

Jolene.

Srednje rana sorta lijepog izgleda pokožice, pogodna za prženje



Maloprodaja
Svježa



Tradicionalni

Image:

- ▶ **Svjetlo žuta boja mesa**
- ▶ **Pogodna sorta za različite kulinarske namjene**
- ▶ **Vrlo dobar postotak suhe tvari**

characteristics

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
Križanje: SAGITTA x AR 03-1491
Autorsko pravo: 31-12-2050
Sjeme: AR 09-2556

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje kasna berba / 6
Svijetla boja klice: crvena / R
Boja cvijeta: bijela / W
Broj bobica: ispod prosjeka / 7
Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7,5
Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8
Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7,5
Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6
Boja pokožice: žuta / Y
Boja mesa: svjetložuta / 6
Glatkoća pokožice: dobar / 7
Oblik gomolja: ovalno izduženi / OL
Ujednačenost oblika gomolja: pravilan / 7
Tuberizacija: umjereno velik / 7
Krupnoća gomolja: umjereno krupan / 7,5
Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7
Dormantnost: prosječna / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7
Nagnječenje (unutarnje): malo osjetljiv / 7
Raspuknuća gomolja: malo osjetljiv / 7
Oštećenje prilikom berbe: umjereno osjetljiv / 6
Metribuzin: umjereno osjetljiv / 6,5
Metribuzin: malo osjetljiv do neosjetljiv / 8
Bentazon: - / -
Etilen: 15% do 25% više gomolja / 7
Podvodna težina: 389
Postotak suhe tvari: 21,1%
Kulinarski tip: umjereno brašnast / B
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): umjereno osjetljiv / 6,5
Oksidacija sirovog krumpira: malo osjetljiv / 7
Kvaliteta prženih krumpirića: dobar / 7
Raspodjela suhe tvari: - / -
Čips kvaliteta: nije pogodan / 5
TGA razina: 6,9
Karvonsko ulje: 15% do 25% više gomolja / 7
Stopa mutacije: Ova sorta može pokazati visoku stopu mutacije. Stoga se uporaba karvonskog ulja ne preporučuje. / Use of carvone oil can provoke mutations.

How to grow



Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 10%.

Tretiranje sjemena

Moguća je sadnja izravno iz hladnjače, po mogućnosti nakon kratkog toplinskog šoka (zagrijavanja). Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 plants/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja može izazvati reakciju na lišću i određeno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje dva tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za srednje dugo skladištenje.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): umjereno do neosjetljiv / 8

Prskanje: umjereno osjetljiv / 6

Fitoftora (plamenjača) lista: vrlo osjetljiv / 4

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 6

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: umjereno osjetljiv / 6,5

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Nagnječenje: umjereno osjetljiv / 7,5

Erwinia (crna noga): - / -

Bradavičasta bolest krumpira F1: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: - / -

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

R_Golden nematode Ro 5: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -