

Kuroda.



Tradicionalni

Srednje kasna sorta crvene boje pokožice, izvrsno podnosi visoke temperature, jako dobrog prinosa.

Image:

- ▶ **Krupni gomolji**
- ▶ **Dobro skladištenje**
- ▶ **Otporna na više tipova bradavičaste bolesti krumpira**

characteristics

Opće karakteristike

Uzgajivač: G. Kuik

Križanje: AR 76-199-03 x KO 80-1407

Autorsko pravo: 31-12-2025

Sjeme: KK 83-0216

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje kasna berba / 6

Svijetla boja klice: plavo ljubičasta / BV

Boja cvijeta: ljubičasta / P

Broj bobica: prosječan / 6

Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7

Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8

Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7,5

Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7

Boja pokožice: crvena / R

Boja mesa: svjetložuta / 6

Glatkoća pokožice: dobar / 7

Oblik gomolja: ovalan / O

Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6,5

Tuberizacija: umjereno mali / 5

Krupnoća gomolja: krupan / 8

Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7

Dormantnost: duga / 8

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: malo osjetljiv / 7

Nagnječenje (unutarnje): umjereno osjetljiv / 6

Raspuknuća gomolja: malo osjetljiv / 7

Oštećenje prilikom berbe: osjetljiv / 5

Metribuzin: osjetljiv / 5

Metribuzin: osjetljiv / 5

Bentazon: - / -

Etilen: 15% do 25% više gomolja / 7

Podvodna težina: 426

Postotak suhe tvari: 23%

Kulinarski tip: brašnast / BC

Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): vrlo osjetljiv / 4,5

Oksidacija sirovog krumpira: - / -

Kvaliteta prženih krumpirića: ispodprosječan / 5,5

Raspodjela suhe tvari: - / -

Čips kvaliteta: nije pogodan / 5

TGA razina: -

Karvonsko ulje: 5% do 15% više gomolja / 6



How to grow

Gnojidba¹

Dušik: standardne preporuke + 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 20%.

Tretiranje sjemena

Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja. Proizvoljno jednokratno uklanjanje klice.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 biljaka/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 biljaka/ha)

Korov

Nemojte koristiti metribuzin (Sencor) nakon nicanja jer uzrokuje jaku reakciju na lišću i znatno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za dugotrajno skladištenje.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: umjereno osjetljiv / 6

Virus - Yn: umjereno osjetljiv / 7

Virus - Yntn (gomolj): umjereno osjetljiv / 7

Prskanje: umjereno osjetljiv / 7

Fitoftora (plamenjača) lista: osjetljiv / 5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: osjetljiv / 5

Fusarium (suha trulež): umjereno do neosjetljiv / 8

Obična krastavost: osjetljiv / 5

Praškasta krastavost: vrlo osjetljiv / 2

Virus - A: umjereno do neosjetljiv / 9

Virus - X: osjetljiv / 5,5

Nagnječenje: - / -

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: malo osjetljiv / 9

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: - / -

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -