

Manitou.

Kasna sorta atraktivne boje pokožice i visokog prinosa.



Maloprodaja
Svježa



Tradicionalni

Image:

- ▶ **Krupni gomolji**
- ▶ **Dobra otpornost na sušu**
- ▶ **Otporan na više tipova krumpirove cistolike nematode**

characteristics

Opće karakteristike

Uzgajivač: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Križanje: LAURA x MARANCA
Autorsko pravo: 31-12-2037
Sjeme: MA 96-0419

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: kasna berba / 5
Svijetla boja klice: crveno ljubičasta / RV
Boja cvijeta: ljubičasta / P
Broj bobica: iznadprosječan / 5
Lisna masa - početni razvoj: prilično brzo / 7
Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8
Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7
Lisna masa - razvrstavanje: prilično lako / 7
Boja pokožice: crvena / R
Boja mesa: svjetložuta / 6
Glatkoća pokožice: dobar / 7
Oblik gomolja: izduženo ovalan / LO
Ujednačenost oblika gomolja: umjereno pravilan / 6,5
Tuberizacija: umjereno velik / 7
Krupnoća gomolja: krupan / 8
Ujednačenost veličine gomolja: pravilan / 7
Dormantnost: umjereno kratka / 5,5

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5
Nagnječenje (unutarnje): malo osjetljiv / 7,5
Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6
Oštećenje prilikom berbe: osjetljiv / 5,5
Metribuzin: vrlo osjetljiv / 4
Metribuzin: vrlo osjetljiv / 3,5
Bentazon: malo osjetljiv / 7
Etilen: 15% do 25% više gomolja / 7
Podvodna težina: 351
Postotak suhe tvari: 19,4%
Kulinarski tip: umjereno brašnast / B
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): malo osjetljiv / 7
Oksidacija sirovog krumpira: - / -
Kvaliteta prženih krumpirića: ispodprosječan / 5,5
Raspodjela suhe tvari: - / -
Čips kvaliteta: nije pogodan / 4,5
TGA razina: 3,4
Karvonsko ulje: 5% manje gomolja / 4

How to grow



Gnojdba¹

Dušik: standardne preporuke.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 10%.

Tretiranje sjemena

Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 biljaka/ha)

Korov

Nemojte koristiti metribuzin (Sencor) nakon nicanja jer uzrokuje jaku reakciju na lišću i znatno smanjenje prinosa.

Fungicidi

Potrebno je strogo pridržavanje preventivnog prskanja protiv plamenjače.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Prikladno za srednje dugo skladištenje.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - Yn: umjereno osjetljiv / 6,5

Virus - Yntn (gomolj): umjereno osjetljiv / 7

Prskanje: umjereno osjetljiv / 7

Fitoftora (plamenjača) lista: osjetljiv / 5

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno osjetljiv / 6

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 7

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno osjetljiv / 7

Nagnječenje: umjereno osjetljiv / 7

Erwinia (crna noga): umjereno osjetljiv / 6

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: otporan / 9

R_Golden nematode Ro 5: otporan / 9

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -