

Alouette.

Višenamjenska srednje kasna sorta crvene boje kože, otporna na plamenjaču lišća i gomolja, prikladna za konvencionalnu i organsku proizvodnju.



Organski



Prerada
Pogodnost



Maloprodaja
Svježa



Tradicionalni

- ▶ **Dobra tolerancija na nagnječenja**
- ▶ **Prikladan za kuhanje i pripremanje u domaćinstvu**
- ▶ **Dobro podnosi sušu**



characteristics

Opće karakteristike

Uzgajivač: Agrico Research B.V.
Križanje: AR 02-139-1 x LAURA
Autorsko pravo: 31-12-2044
Sjeme: AR 04-3153

Karakteristike biljke i gomolja

Zrioba: srednje kasna berba / 6
Svijetla boja klice: crveno ljubičasta / RV
Boja cvijeta: svjetloljubičasta / LP
Broj bobica: vrlo visok / 4
Lisna masa - početni razvoj: brzo / 8
Krajnji razvoj lisne mase: dobro / 8
Lisna masa - čvrstoća: sasvim čvrsto / 7,5
Lisna masa - razvrstavanje: prosječno / 6
Boja pokožice: crvena / R
Boja mesa: žuta / 7,5
Glatkoća pokožice: dobar / 7
Oblik gomolja: ovalno izduženi / OL
Ujednačenost oblika gomolja: pravilan / 7
Tuberizacija: prosječan / 6
Krupnoća gomolja: umjereno krupan / 7
Ujednačenost veličine gomolja: umjereno pravilan / 6,5
Dormantnost: prosječna / 6

Osjetljivost i kvaliteta

Sekundarni rast: umjereno osjetljiv / 6,5
Nagnječenje (unutarnje): malo do neosjetljiv / 8
Raspuknuća gomolja: umjereno osjetljiv / 6,5
Oštećenje prilikom berbe: umjereno osjetljiv / 6
Metribuzin: malo osjetljiv / 7,5
Metribuzin: malo osjetljiv / 7
Bentazon: malo osjetljiv / 7
Etilen: 5% manje gomolja / 4
Podvodna težina: 389
Postotak suhe tvari: 21,1%
Kulinarški tip: umjereno čvrst / AB
Promjena boje u sivo (nakon kuhanja): malo osjetljiv / 7
Oksidacija sirovog krumpira: malo osjetljiv / 7
Kvaliteta prženih krumpirića: iznadprosječan / 6,5
Raspodjela suhe tvari: - / -
Čips kvaliteta: - / -
TGA razina: 3,6
Karvonsko ulje: 5% do 15% više gomolja / 6
Stopa mutacije: Ova sorta može pokazati □□visoku stopu mutacije. Stoga se uporaba karvonskog ulja ne preporučuje. / Use of carvone oil can provoke mutations.


www.interagrico.hr

How to grow

Gnojdba¹

Dušik: standardne preporuke + 10%.

Fosfat: standardne preporuke.

Kalij: standardne preporuke + 20%.

Tretiranje sjemena

Poželjna je sadnja gomolja u toplo tlo zbog početnog sporog razvoja ove sorte. Pravilno naklijavanje nakon uklanjanja prve klice može povoljno utjecati na zametanje gomolja. Uklanjanje klice više nego jedanput može imati nepovoljan utjecaj na prinos i ujednačenost rasta.

Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67.000 biljaka/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 biljaka/ha)

¹ Gnojdba se temelji na analizi tla

Korov

Standardna primjena metribuzina (Sencor) nakon nicanja ne uzrokuje reakciju na lišću niti utječe na smanjenje prinosa.

Fungicidi

Unatoč otpornosti na plamenjaču potrebno je obratiti pažnju na znakove infekcije.

Berba

Zbog osjetljivosti na nagnječenja i/ili oštećenja prilikom berbe, sa berbom pričekati najmanje tri tjedna nakon desikacije.

Temperatura skladištenja - Trajanje skladištenja

Preporučena temperatura skladištenja iznosi 5 °C. Za potrebe prerade nemojte skladištiti ispod 7 °C. Prikladno za srednje dugo skladištenje.



Otpornosti

Virus - uvijenost lišća: - / -

Virus - Yn: umjereno do neosjetljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): umjereno osjetljiv / 7

Prskanje: osjetljiv / 5,5

Fitoftora (plamenjača) lista: umjereno do neosjetljiv / 9

Fitoftora (plamenjača) gomolja: umjereno do neosjetljiv / 9

Fusarium (suha trulež): umjereno osjetljiv / 7,5

Obična krastavost: umjereno osjetljiv / 6

Praškasta krastavost: umjereno osjetljiv / 6,5

Virus - A: - / -

Virus - X: umjereno osjetljiv / 7

Nagnječenje: - / -

Erwinia (crna noga): - / -

Bradavičasta bolest krumpira F1: otporan / 10

Bradavičasta bolest krumpira F6: - / -

Bradavičasta bolest krumpira F18: - / -

Zlatna nematoda Ro 1/4: otporan / 9

Zlatna nematoda Ro 2/3: otpornost u polju / 8

R_Golden nematode Ro 5: umjereno osjetljiv* / 6*

Nematoda Pa 2: - / -

Nematoda Pa 3: - / -

Say potato,
say Agrico.